

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя  
Комитета контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения и  
социального развития РК  
от «10» \_\_06\_\_ 2016г.  
№ 002317

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства  
ЭНЭРИОН®**

**Торговое название**  
ЭНЭРИОН®

**Международное непатентованное название**  
Сульбутиамин

**Лекарственная форма**  
Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг

**Состав**  
Одна таблетка содержит  
*активное вещество* – сульбутиамин 200 мг,  
*вспомогательные вещества*: глюкоза безводная, лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный, клейстер крахмальный, тальк,  
*оболочка*: воск пчелиный белый, натрия кармеллоза, этилцеллюлоза, глицерина моноолеат, полисорбат 80, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, сахароза, краситель желтый солнечный закат FCF, лак алюминийевый (E110), тальк, титана диоксид (E171).

**Описание**  
Таблетки чечевицеобразной формы, покрытые сахарной оболочкой оранжевого цвета

**Фармакотерапевтическая группа**  
Витамины. Витамин В<sub>1</sub>. Сульбутиамин  
Код АТХ А11DA02

## **Фармакологические свойства**

### **Фармакокинетика**

После приема внутрь сульбутиамин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Максимальная концентрация препарата ( $C_{max}$ ) в плазме крови достигается через 1-2 часа. Метаболизируется в печени. Период полувыведения ( $T_{1/2}$ ) составляет около 5 часов. Выводится с мочой.

### **Фармакодинамика**

Сульбутиамин - синтетическое соединение, близкое по строению к тиамину. Молекула сульбутиамина имеет открытый триазольный цикл, дополнительную дисульфидную связь и липофильный эфир. Благодаря такой модификации быстро всасывается из ЖКТ и легко проникает через гематоэнцефалический барьер. В отличие от тиамина, способен накапливаться в клетках ретикулярной формации и гиппокампе, а также в клетках волокон Пуркинье и клубочках зернистого слоя коры мозжечка. На фоне приема Энэриона<sup>®</sup> улучшается координация движений и увеличивается устойчивость к физическим нагрузкам, повышается устойчивость структур коры головного мозга к повторяющейся гипоксии.

## **Показания к применению**

– симптоматическое лечение функциональной астении

### **Способ применения и дозы**

Взрослым препарат назначают в суточной дозе 400-600 мг (2-3 таблетки), разделенные на два приема

Таблетки следует принимать внутрь во время завтрака и во время обеда, запивая стаканом воды

Продолжительность курса лечения не должна превышать 4-х недель

### **Побочные действия**

- тремор, головная боль, возбуждение, недомогание
- тошнота, рвота
- аллергические реакции (сыпь)

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ
- детский и подростковый возраст до 18 лет

### **Лекарственные взаимодействия**

Данных о взаимодействии с другими препаратами нет.

### **Особые указания**

Препарат содержит лактозу, поэтому его прием противопоказан пациентам с недостаточностью лактазы, врожденной галактоземией и глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции.

#### *Беременность и период лактации*

В связи с отсутствием достаточных клинических данных прием Энэриона® в период беременности и лактации не рекомендуется.

#### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами*

Препарат не влияет на способность к управлению автомобилем и потенциально опасными механизмами.

### **Передозировка**

*Симптомы:* возбужденное состояние, сопровождающееся эйфорией и тремором конечностей.

Симптомы передозировки исчезают самостоятельно и не требуют специального лечения.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

Les Laboratoires Servier Industrie, Франция

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Les Laboratoires Servier, Франция



*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:*

**Представительство Les Laboratoires Servier в РК**

050020, г. Алматы, пр-т Достык 310г, Бизнес центр, 3 этаж

Тел.: (727) 386 76 62/63/64/70/71

Факс: (727) 386 76 67

e-mail: [kazadinfo@kz.netgrs.com](mailto:kazadinfo@kz.netgrs.com)