

## **Листок-вкладыш – информация для пациента**

**Нолипрел® Аргинин, 0,625 мг+2,5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
Действующие вещества: индапамид+периндоприла аргинин

**Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Нолипрел® Аргинин и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед приемом препарата Нолипрел® Аргинин
3. Прием препарата Нолипрел® Аргинин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Нолипрел® Аргинин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### **1. Что из себя представляет препарат Нолипрел® Аргинин и для чего его применяют**

Препарат Нолипрел® Аргинин содержит комбинацию двух действующих веществ: индапамида и периндоприла аргинина. Данный препарат относится к фармакотерапевтической группе под названием: «Гипотензивные средства комбинированные» и применяется для лечения артериальной гипертензии (снижения повышенного артериального давления).

Индапамид является диуретическим (мочегонным) средством и снижает артериальное давление. В отличие от других диуретиков, индапамид при приеме в рекомендованных дозах незначительно увеличивает объем мочи, вырабатываемой почками. Кроме того, индапамид увеличивает растяжимость (эластичность) крупных артерий и уменьшает сопротивление периферических артерий малого диаметра, что также способствует снижению артериального давления.

Периндоприл принадлежит к классу препаратов, которые называются ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Его действие приводит к расширению кровеносных сосудов, снижению сопротивления периферических артерий, улучшению работы миокарда (сердечной мышцы) и снижению нагрузки на сердце.

Одновременный прием индапамида и периндоприла аргинина усиливает действие каждого из них на артериальное давление.

### **Показания к применению**

Препарат Нолипрел® Аргинин показан к применению у взрослых:

- для лечения эссенциальной гипертензии;

- у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со стороны почек) и макрососудистых осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях .

## **2. О чем следует знать перед приемом препарата Нолипрел® Аргинин**

### **Противопоказания**

Не принимайте препарат Нолипрел® Аргинин:

- если у Вас аллергия на индапамид или любой другой сульфонамид, периндоприл или любой другой ингибитор АПФ, или любые другие компоненты данного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- если раньше у Вас при приеме других ингибиторов АПФ развивались такие симптомы, как свистящее дыхание, отек лица или языка, интенсивный зуд или тяжелая кожная сыпь (ангионевротический отек), или у одного из Ваших родственников отмечались такие симптомы при каких-либо обстоятельствах,
- если Вы принимаете препарат для снижения артериального давления, содержащий алискирен, и при этом у Вас есть сахарный диабет и/или нарушение функции почек,
- если у Вас имеется нарушение функции почек, связанное с диабетом, и Вы принимаете препараты блокаторы рецепторов ангиотензина II,
- если у Вас имеется тяжелое заболевание печени или печеночная энцефалопатия (потенциально обратимое нарушение функции головного мозга в результате печеночной недостаточности),
- если у Вас тяжелое заболевание почек, которое может включать стеноз почечной артерии (снижение притока крови к почкам),
- если Вам проводится диализ или любой другой тип фильтрации крови. В зависимости от используемого оборудования, Нолипрел® Аргинин может оказаться не подходящим для Вас препаратом,
- если у Вас низкий уровень калия в крови,
- если у Вас имеется подозрение на нелеченую декомпенсированную сердечную недостаточность (выраженная задержка воды в организме, затрудненное дыхание),
- если Вы принимаете препараты, способные вызвать изменение сердечного ритма (см. подраздел «Другие препараты и препарат Нолипрел® Аргинин»),
- если Вы беременны или планируете беременность (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»),
- если Вы кормите грудью (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»),
- если Вы принимаете комбинацию валсартан + сакубитрил – препарат, применяемый для лечения сердечной недостаточности (см. подразделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Другие препараты и препарат Нолипрел® Аргинин»).

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров (лактазная недостаточность, галактоземия или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции), обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед приемом препарата Нолипрел® Аргинин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас стеноз аорты (сужение главного кровеносного сосуда, идущего от сердца), гипертрофическая кардиомиопатия (заболевание сердечной мышцы) или стеноз почечной артерии (сужение артерии, снабжающей кровью почки),
- если у Вас сердечная недостаточность или другое заболевание сердца,
- если у Вас заболевание почек или Вам проводится диализ,
- если у Вас аномально повышенный уровень гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм),

- если у Вас нарушение функции печени,
- если у Вас системное заболевание соединительной ткани (группа заболеваний, характеризующаяся поражением соединительной ткани), такое как системная красная волчанка или склеродермия,
- если у Вас атеросклероз (образование атеросклеротических бляшек в стенках артерий, сужающих их просвет),
- если у Вас гиперпаратиреоз (повышение функции паращитовидных желез),
- если у Вас подагра (пациенты с гиперурикемией)
- если у Вас гиперкалиемия (повышенное содержание калия в плазме),
- если у Вас есть гипонатриемия (сниженное содержание натрия в плазме),
- если у Вас сахарный диабет,
- если Вы соблюдаете диету с пониженным содержанием соли или принимаете заменители соли, содержащие калий,
- если Вы принимаете литий или калийсберегающие препараты (спиронолактон, триамтерен) или калиевые добавки, так как не следует принимать их одновременно с препаратом Нолипрел® Аргинин (см. «Другие препараты и препарат Нолипрел® Аргинин»),
- если Вы принимаете аллопуринол, цитостатики (препараты для лечения онкологических заболеваний) или иммунодепрессанты или получаете терапию прокаинамидом (препарат для лечения нарушений ритма сердца),
- если Вы получаете терапию препаратами золота, принимаете нестероидные противовоспалительные препараты, баклофен, кортикоステроиды, ингибиторы неприлизина, препараты, которые могут вызвать удлинение интервала QT; сердечные гликозиды, препараты, которые могут вызвать жизнеугрожающие нарушения ритма сердца (полиморфную желудочковую тахикардию типа «пируэт»),
- если у Вас диагностировано угнетение костномозгового кроветворения;
- если Вы – человек пожилого возраста,
- если у Вас церброваскулярное заболевание,
- если у Вас реноваскулярная гипертензия,
- если у Вас лабильные цифры артериального давления (АД) (нестойкое повышение АД),
- если у Вас наблюдались реакции фоточувствительности,
- если Вы испытываете снижение зрения или боль в глазах. Это могут быть симптомы скопления жидкости в сосудистом слое глаза (хориоидальный выпот) или повышение давления в глазу, что может произойти в течение нескольких часов или недель после приема препарата Нолипрел® Аргинин. При отсутствии лечения это может привести к необратимой потере зрения. Если у Вас ранее была аллергия на пенициллин или сульфаниламид, у Вас может быть повышенный риск ее развития.
- если у Вас наблюдались серьезные аллергические реакции с отеком лица, губ, рта, языка и горла, которые могли сопровождаться затруднением глотания или дыхания (ангинаевротический отек). Такое может возникнуть в любое время во время лечения. Если у Вас развились такие симптомы, Вы должны **прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу**.
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, используемых для лечения высокого артериального давления:
  - блокаторы рецепторов ангиотензина II (также известные как сартаны - например, валсартан, ирбесартан, телмисартан), особенно если у Вас есть связанные с сахарным диабетом проблемы с почками,
  - алискирен.

Ваш врач может проводить регулярный контроль функции почек, артериального давления и содержания электролитов (например, калия) в крови.

Смотрите также информацию, приведенную в разделе «Противопоказания».

- если Вы принадлежите к негроидной расе, так как Вы можете быть подвержены более высокому риску развития ангионевротического отека, а также этот препарат может быть менее эффективен в снижении артериального давления в сравнении с пациентами другой расовой принадлежности,
- если Вы проходите диализ с высокопроницаемыми мембранами,
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, риск развития ангионевротического отека может повыситься:
  - рацекадотрил (используется для лечения диареи),
  - сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR (используются для предотвращения отторжения пересаженных органов),
  - сакубитрил (выпускается в фиксированной комбинации с валсартаном), применяющийся для лечения хронической сердечной недостаточности.

#### *Ангионевротический отек*

Случаи ангионевротического отека (серьезной аллергической реакции с отеком лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания) были отмечены у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, в том числе и Нолипрел® Аргинин. Эти реакции могут наступить в любой момент во время терапии. Если у Вас появились данные симптомы, Вы должны немедленно прекратить прием Нолипрел® Аргинин и немедленно обратиться к врачу. Смотрите также раздел 4.

Вы должны сказать Вашему врачу, если Вы думаете, что беременны (или планируете забеременеть). Нолипрел® Аргинин не должен приниматься во время беременности, так как это может причинить серьезный вред ребенку (смотрите подраздел «Беременность и грудное вскармливание»).

*Когда Вы принимаете Нолипрел® Аргинин, Вы должны также проинформировать Вашего лечащего врача или медицинский персонал о следующих ситуациях:*

- если Вам предстоит анестезия и/или серьезная хирургическая операция,
- если у Вас недавно наблюдались диарея, рвота или обезвоживание организма,
- если Вам необходимо проводить диализ или аферез липопротеинов низкой плотности (аппаратное выведение холестерина из крови),
- если Вы проходите десенситизацию, которая должна уменьшить аллергические реакции на укусы пчел или ос,
- если Вы проходите медицинское обследование, для которого требуется введение йодсодержащего рентгеноконтрастного вещества (вещества, которое делает возможным обследование внутренних органов, например, почек или желудка, с помощью рентгеновских лучей).

Спортсмены должны знать, что препарат Нолипрел® Аргинин содержит действующее вещество (индапамид), которое может дать положительную реакцию при проведении допинг-контроля.

#### *Дети*

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет в связи с тем, что данные об эффективности и безопасности препарата Нолипрел® Аргинин отсутствуют.

#### *Другие препараты и препарат Нолипрел® Аргинин*

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Избегайте одновременного приема препарата Нолипрел® Аргинин со следующими препаратами:

- препараты лития (используется для лечения мании или депрессии),

- алисцирен (препарат для лечения повышенного артериального давления), если у Вас нет сахарного диабета или нарушения функции почек,
- калийсберегающие диуретики (например, триамтерен, спиронолактон, амилорид), калиевые соли, а также другие препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме (например, гепарин и ко-тимоксазол, также известный как сульфаметоксазол+триметоприм),
- эстрамустин (применяется при лечении онкологических новообразований),
- другие препараты для лечения повышенного артериального давления: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

На режим терапии препаратом Нолипрел® Аргинин может повлиять прием других препаратов. Ваш врач может изменить дозу и/или предпринять другие меры предосторожности. Обязательно поставьте в известность своего лечащего врача, если вы принимаете следующие препараты, так как при их приеме следует соблюдать особую осторожность:

- препараты, которые используются при лечении повышенного артериального давления, включая блокаторы рецепторов ангиотензина II или алисцирен (см. также информацию, приведенную в подразделах «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»), или диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками),
- калийсберегающие препараты, применяемые при лечении сердечной недостаточности: эплеренон и спиронолактон в дозах от 12,5 до 50 мг/день,
- препараты, которые наиболее часто используются для лечения диареи (рацекадотрил) или для предупреждения отторжения трансплантированных органов (сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR). См. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»,
- комбинация валсартан+сакубитрил (применяемая для лечения хронической сердечной недостаточности). См. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»,
- пропофол, севофлуран (препараты для проведения анестезии),
- йодсодержащие рентгеноконтрастные вещества,
- левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин, цiproфлоксацин, эритромицин при внутривенном введении, азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спирамицин, ко-тимоксазол (антибиотики, которые используются для лечения инфекций),
- аллопуринол (для лечения подагры),
- мизоластин, терфенадин или астемизол (антагистаминные препараты для лечения сенной лихорадки или аллергии),
- кортикоステроиды, которые используются для лечения различных заболеваний, включая тяжелую бронхиальную астму и ревматоидный артрит,
- иммунодепрессанты, которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус),
- галофантрин, лумефантрин, мефлохин, хинин, хлорофил (используются для лечения некоторых видов малярии),
- пентамидин (используется для лечения пневмонии),
- ауротиомалат натрия (инъекционный препарат золота) (используется для лечения ревматоидного полиартрита),
- винкамин (используется для симптоматического лечения когнитивных нарушений у пожилых пациентов, включая потерю памяти),
- бепридил, ранолазин (используются для лечения стенокардии напряжения),
- вориконазол, итраконазол, кетоконазол, флуконазол (противогрибковые средства),

- вандетаниб, мышьяка триоксид, оксалиплатин, такролимус, анагрелид ( противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы),
- ондансетрон (противорвотные средства),
- алтеплаза (тромболитики, препараты применяющиеся для воздействия на тромб),
- препараты, назначаемые при лечении нарушений сердечного ритма (например, хинидин, гидрохинидин, прокаинамид, дизопирамид, флексанид, амиодарон, сotalол, дофетилид, ибутилид, бретилия тозилат, дронедарон),
- цизаприд, дифеманил, домперидон (используются для лечения желудочно-кишечных расстройств),
- дигоксин или другие сердечные гликозиды (для лечения сердечных заболеваний),
- баклофен (для лечения ригидности мышц, возникающей при таких заболеваниях, как рассеянный склероз),
- препараты для лечения сахарного диабета, такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин),
- кальций, включая добавки кальция,
- стимулирующие слабительные (например, сenna),
- нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибuproфен) или высокие дозы салицилатов (например, ацетилсалициловая кислота),
- амфотерицин В в инъекционной форме (для лечения серьезных грибковых заболеваний),
- препараты для лечения психических нарушений, таких как депрессия, тревога, шизофрения и др. (например, трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как циталопрам, эсциталопрам, нейролептики для лечения психоза, такие как хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин, флуфеназин, амисульприд, сульпирид, сультоприди, тиаприди, галоперидол, дроперидол, пимозид, сертиндол),
- тетракозактид (для лечения болезни Крона),
- триметоприм (для лечения инфекций),
- сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (препараты, вызывающие расширение кровеносных сосудов),
- вазопрессин (препарат для терапии несахарного диабета),
- терлипрессин (препарат для терапии кровотечений из ЖКТ, органов мочевыделительной и половой системы),
- кетансерин(вазодилататоры),
- пробукол (гиполипидемическое средство.),
- теродилин (спазмолитик),
- цилостазол (препарат для терапии перемежающейся хромоты).
- препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин).

### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Беременность**

Вы должны проинформировать своего лечащего врача, если думаете, что беременны (или можете забеременеть). Как правило, врач посоветует Вам прекратить прием препарата Нолипрел® Аргинин до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнаете, что беременны. Врач посоветует Вам принимать другой препарат вместо препарата Нолипрел® Аргинин. Препарат Нолипрел® Аргинин противопоказан во время беременности, так как его прием может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

### *Грудное вскармливание*

Вы не должны принимать Нолипрел® Аргинин если Вы кормите грудью.

Немедленно сообщите своему лечащему врачу о том, что Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Немедленно обратитесь к своему лечащему врачу.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Нолипрел® Аргинин не влияет на скорость реакции, но у некоторых пациентов из-за пониженного артериального давления могут проявиться различные реакции, например, головокружение или слабость. В результате способность управлять транспортами средствами или другими механизмами может быть нарушена.

### **Препарат Нолипрел® Аргинин содержит лактозы моногидрат**

Если у Вас имеется непереносимость некоторых видов сахаров, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед приемом данного препарата.

### **Препарат Нолипрел® Аргинин содержит натрий**

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

## **3. Прием препарата Нолипрел® Аргинин**

Всегда принимайте препарат Нолипрел® Аргинин в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

Рекомендуемая доза: одна таблетка в сутки. Ваш лечащий врач может изменить режим приема препарата (например, если у Вас выявлено нарушение функции почек).

### **Способ применения**

Внутрь, предпочтительно утром, перед приемом пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой.

### **Продолжительность применения**

Препараты для лечения эссенциальной гипертензии должны приниматься постоянно.

### **Если Вы приняли препарата Нолипрел® Аргинин больше, чем следовало**

Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Наиболее вероятным симптомом в случае передозировки является снижение артериального давления. Если у Вас резко снизилось артериальное давление (состояние, сопровождающееся тошнотой, рвотой, судорогами, головокружением, сонливостью, спутанностью сознания, изменением объема мочи, выделяемого почками), примите горизонтальное положение и приподнимите ноги. Это может улучшить Ваше состояние.

### **Если Вы забыли принять препарат Нолипрел® Аргинин**

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять очередную дозу препарата Нолипрел® Аргинин, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную

дозу лекарственного препарата Нолипрел® Аргинин, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

**Если Вы прекратили принимать препарат Нолипрел® Аргинин**

Поскольку лечение повышенного артериального давления обычно проводится постоянно, не прекращайте прием лекарственного препарата Нолипрел® Аргинин без предварительного обсуждения с Вашим лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата Нолипрел® Аргинин, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Нолипрел® Аргинин может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

**Прекратите прием препарата Нолипрел® Аргинин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одной из следующих серьезных нежелательных реакций:**

- сильное головокружение или потеря сознания, вызванные низким артериальным давлением (часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10),
- бронхоспазм (чувство сжатия в груди, свистящее дыхание и одышка) (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100),
- отек лица, губ, рта, языка или горла, затрудненное дыхание (ангионевротический отек) (см. раздел 2 «Особые указания и меры предосторожности») (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100),
- тяжелые кожные реакции, включающие многоформную эритему (кожная сыпь, часто начинающаяся с появления красных зудящих участков на лице, руках или ногах) или интенсивные кожные высыпания, крапивницу, покраснение кожи на всей поверхности тела, сильный зуд, возникновение пузьрей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) или другие аллергические реакции (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- нарушения со стороны сердца (нарушения ритма сердца (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий), стенокардия (боли в груди, челюсти и спине, вызванные физической нагрузкой), инфаркт миокарда (сердечный приступ) (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- слабость в руках или ногах, проблемы с речью, что может являться признаком инсульта (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое может вызвать серьезные боли в животе и спине, сопровождающиеся плохим самочувствием (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- пожелтение кожи или белков глаз (желтуха), что может являться признаком гепатита (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- угрожающая жизни аритмия (полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт») (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно),
- заболевание головного мозга, вызванное нарушением функции печени (печеночная энцефалопатия) (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно),
- снижение зрения или боль в глазах из-за высокого давления (возможные признаки скопления жидкости в сосудистой оболочке глаза (хориоидальный выпот) или острая

закрытоугольная глаукома (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно).

В порядке убывания по частоте возникновения, нежелательные реакции могут быть следующими:

**- часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10:**

кожные реакции у пациентов с предрасположенностью к аллергическим и астматическим реакциям, головная боль, головокружение, вертиго, парестезия (ощущение покалывания в конечностях), нарушение зрения, звон в ушах (ощущение шума в ушах), кашель, одышка, нарушение со стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия (искажение вкусовых ощущений), диспепсия или затрудненное пищеварение, диарея, запор), аллергические реакции (такие как кожная сыпь, кожный зуд), спазм мышц, астении;

**- нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100:**

перепады настроения (лабильность настроения), нарушение сна, крапивница, пурпур (красные точечные пятна на коже), пемфигоид (очаговое образование волдырей на коже), почечная недостаточность (нарушение функции почек), эректильная дисфункция (импотенция), повышенное потоотделение (потливость), эозинофилия (повышенное содержание эозинофилов (вид лейкоцитов), изменение лабораторных параметров: гиперкалиемия (высокий уровень калия в крови), снижающийся после прекращения терапии), гипонатриемия (низкий уровень натрия); сонливость, обморок (потеря сознания), ощущение сердцебиения (ощущение биения собственного сердца), тахикардия (учащенное сердцебиение), гипогликемия (очень низкий уровень сахара в крови) у пациентов, страдающих диабетом, васкулит (воспаление кровеносных сосудов), сухость слизистой оболочки полости рта, реакции фоточувствительности (повышенная чувствительность кожи к солнцу), артрит (боль в суставах), миалгия (боль в мышцах), боль в грудной клетке, недомогание, периферический отек, лихорадка, повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, падение;

**- редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000:**

обострение (ухудшение течения) псориаза, изменения лабораторных параметров: повышение активности «печеночных» ферментов, гипербилирубинемия (повышение концентрации билирубина в крови); повышенная утомляемость;

**- очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:**

спутанность сознания, эозинофильная пневмония (редкий тип пневмонии), ринит (заложенность носа или насморк), острые почечные недостаточности (тяжелые нарушения со стороны почек); нарушения со стороны крови, такие как уменьшение количества лейкоцитов и эритроцитов: агранулоцитоз, апластическая анемия, панцитопения, лейкопения, нейтропения, гемолитическая анемия, снижение гемоглобина и гематокрита, тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов) гиперкальциемия (высокий уровень кальция в крови), нарушение функции печени;

**- неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):**

отклонения (удлинение интервала QT) на электрокардиограмме (ЭКГ), изменение лабораторных параметров: снижение содержание калия с гипокалиемией (низкое содержание калия), повышение концентрации мочевой кислоты (высокий уровень мочевой кислоты) и глюкозы в крови (высокий уровень сахара в крови); миопия

(близорукость), нечеткость зрения, синдром Рейно (онемение и боль в пальцах рук и ног). Если у Вас системная красная волчанка (вид заболевания соединительной ткани), Ваше состояние может ухудшиться.

Могут возникать нарушения со стороны крови, почек, печени или поджелудочной железы и изменения лабораторных параметров (в анализах крови). Ваш лечащий врач может назначить проведение анализа крови для контроля Вашего состояния.

Повышение концентрации мочи (при этом отмечается ее потемнение), тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания и судороги могут быть вызваны неадекватной секрецией АДГ (антидиуретического гормона). Если у Вас возникли такие симптомы, свяжитесь с Вашим лечащим врачом как можно скорее.

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях лекарственного препарата напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **Российская Федерация**

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Тел: +7 (800) 550 99 03

Эл. почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<http://roszdravnadzor.gov.ru>

#### **Республика Армения**

АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика

Э. Габриеляна»

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Тел.: +374 (60) 83 00 73, +374 (10) 23 08 96, +374 (10) 23 16 82

Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарств: +374 (10) 20 05 05, +374 (96) 22 05 05

Эл. почта: [admin@pharm.am](mailto:admin@pharm.am), [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am)

<http://pharm.am>

#### **Республика Беларусь**

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а.

Тел.: +375 (17) 231 85 14

Факс.: +375 (17) 252 53 58

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29

Эл. почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by), [rceth@rceth.by](mailto:rceth@rceth.by)

<http://www.rceth.by>

#### **Республика Казахстан**

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»

Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А.Иманова, 13 (БЦ «Нурсаulet 2»)

Тел.: +7 (717) 278 99 11

Эл. почта: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)

<http://www.ndda.kz>

Кыргызская Республика  
Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве  
Здравоохранения Кыргызской Республики  
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25  
Тел.: +996 (312) 21 92 78  
Эл. почта: [dlsmi@pharm.kg](mailto:dlsmi@pharm.kg)  
<http://pharm.kg>

## 5. Хранение препарата Нолипрел® Аргинин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### Препарат Нолипрел® Аргинин содержит

Действующими веществами являются индапамид и периндоприла аргинин. Каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой, содержит 0,625 мг индапамида и 2,5 мг периндоприла аргинина (соответствует 1,6975 мг основания периндоприла). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат, магния стеарат, мальтодекстрин, кремния диоксид коллоидный безводный, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), глицерол, гипромеллоза, макрогол 6000, магния стеарат, титана диоксид (E171).

### Внешний вид препарата Нолипрел® Аргинин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Препарат представляет собой продолговатые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, с риской на обеих сторонах. Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

### При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция:

По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

### При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция и расфасовке/упаковке на ООО «СЕРВЬЕ РУС», Россия:

По 14 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачку картонную с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

При производстве на ООО «СЕРВЬЕ РУС», Россия:

По 14, 29 или 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14, 29 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция и расфасовке/упаковке на «Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд», Ирландия:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

**Держатель регистрационного удостоверения**

«Лаборатории Сервье»/Les Laboratoires Servier  
92284 Франция, Сюрен Седекс, ул. Карно 50/  
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France,

**Производитель**

ООО «СЕРВЬЕ РУС»

108828 Россия, г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал 158, владение 2, стр. 1  
или

«Лаборатории Сервье Индастри»/Les Laboratoires Servier Industrie  
905, шоссе Саран, 45520 Жиди, Франция/905, route de Saran, 45520 Gidy, France  
или

«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд»/Servier (Ireland) Industries Ltd  
Графство Уиклоу, Арклоу, Гори роуд, Манилендс, Y14 E284, Ирландия/  
Co. Wicklow, Arklow, Gorey Road, Moneylands, Y14 E284, Ireland

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Серье»

Адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 7/8/9

Тел.: +7 (495) 937 07 00

Факс: +7 (495) 937 07 01

Эл. почта: [servier.russia@servier.com](mailto:servier.russia@servier.com)

**Республика Армения**

Представительство «Лаборатории Серье»

Адрес: 0002, г. Ереван, улица Амиряна, 15, магазин 100, Кентрон

Тел.: +374 (10) 50 50 74

Эл. почта: [mariam.antonyan@servier.com](mailto:mariam.antonyan@servier.com)

**Республика Беларусь**

Представительство УАО “Les Laboratoires Servier” (Французская Республика) в

Республике Беларусь

Адрес: 220030, г. Минск. ул. Мясникова, 70, оф. 303

Тел.: +375 (17) 306 54 55/56

Эл. почта: [officeBY@servier.com](mailto:officeBY@servier.com)

**Республика Казахстан и Кыргызская Республика**

ТОО «Серье Казахстан»

Адрес: 050020, г. Алматы, пр. Достык 310Г

Тел.: +7 (727) 386 76 62

Эл. почта: [kazadinfo@servier.com](mailto:kazadinfo@servier.com)

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org>.

Листок-вкладыш доступен на всех языках Союза на веб-сайте Союза.

## **Қосымша парак - пациентке арналған ақпарат**

**Нолипрел® Аргинин, 0,625 мг+2,5 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар**  
Әсер етуші заттар: индапамид+периндоприл аргинині

**Препаратты қабылдар алдында қосымша паракты толығымен оқып шығыңыз, себебі мұнда Сіз үшін маңызды мәліметтер қамтылған.**

- Қосымша паракты сақтап қойыңыз. Сізге оны қайтадан оку қажет болуы мүмкін.
- Егер Сізде қосымша сұрақтар туындаса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.
- Препарат нақты Сізге тағайындалған. Оны басқа адамдарға берменіз. Ол олардың ауру симптомдары Сіздікіне сәйкес келсе де, оларға зиян тигізуі мүмкін.
- Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар пайда болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз. Бұл ұсыным кез келген ықтимал жағымсыз реакцияларға, оның ішінде қосымша парактың 4-бөлімінде атап көрсетілмеген реакцияларға қолданылады.

### **Қосымша парактың мазмұны**

1. Нолипрел® Аргинин препараты дегеніміз не және ол не үшін қолданылады
2. Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдар алдында нені білу керек
3. Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдау
4. Үқтимал жағымсыз реакциялар
5. Нолипрел® Аргинин препаратын сақтау
6. Қаптаманың ішіндегісі және өзге де мәліметтер

### **1. Нолипрел® Аргинин препараты дегеніміз не және ол не үшін қолданылады**

Нолипрел® Аргинин препаратының құрамында екі әсер етуші заттың біріктірілімі бар: индапамид және периндоприл аргинині. Бұл препарат "Гипотензивті біріктірілген дәрілер" деп аталатын фармакотерапиялық топқа жатады және артериялық гипертензияны емдеу үшін қолданылады (жоғары артериялық қысымды төмендету).

Индапамид диурездік (несеп айдайтын) дәрі болып табылады және артериялық қысымды төмендетеді. Басқа диуретиктерден айырмашылығы, индапамид ұсынылған дозаларда қабылдаған кезде бүйрекпен шығаратын несеп көлемін шамалы арттырады. Сонымен қатар, индапамид үлкен артериялардың созылуын (серпімділігін) арттырады және кіші диаметрлі шеткегі артериялардың кедергісін азайтады, бұл артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі.

Периндоприл ангиотензин өзгереттін фермент тежегіштері (АТФ) деп аталатын препараттар класына жатады. Оның әсері қантамырлардың кеңеюіне, шеткегі артериялар кедергісінің төмендеуіне, миокардтың (жүрек бұлышықетінің) жақсаруына және жүрек жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

Индапамид пен периндоприл аргининің бір мезгілде қабылдау олардың әрқайсысының артериялық қысымға әсерін күштейтеді.

### **Қолданылуы**

Нолипрел® Аргинин препараты ересектерде қолдануға арналған:

- эссенциальді гипертензияны емдеу үшін;
- артериялық гипертензиясы және 2 типті қант диабеті бар пациенттерде жүрек-қантамыр ауруларындағы микротамырлы асқынулардың (бүйрек тарапынан) және макротамырлы асқынулардың даму қаупін азайту үшін.

## **2. Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдар алдында нені білу керек**

### **Колдануға болмайтын жағдайлар**

Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдамаңыз:

- егер сіз индапамидке немесе кез келген басқа сульфонамидке, периндоприлге немесе кез келген басқа АӨФ тежегішіне немесе осы препараттың кез келген басқа компоненттеріне аллергияның болса (қосымша парактың 6-бөлімінде көрсетілген),
- егер бұрын Сізде басқа АӨФ тежегіштерін қабылдаған кезде ыскырық дем, беттің немесе тілдің ісінуі, қарқынды қышыну немесе терінің қатты бәртпесі (ангионевроздық ісіну) сияқты симптомдар пайда болса немесе туыстарыңыздың бірінде мұндай симптомдар кез келген жағдайда пайда болса,
- егер Сіз артериялық қысымды төмендететін, құрамында алискирен бар препаратты қабылдап жүрсөніз және Сізде қант диабеті және/немесе бүйрек функциясының бұзылуы орын алса,
- егер Сізде диабетпен байланысты бүйрек функциясының бұзылуы болса және ангиотензин II рецепторларының блокаторларын қабылдап жүрсөніз,
- егер Сізде бауырдың ауыр ауруы немесе бауыр энцефалопатиясы болса (бауыр жеткіліксіздігінің салдарынан ми функциясының ықтимал қайтымды бұзылуы),
- егер Сізде бүйрек артериясының стенозы болуы мүмкін ауыр бүйрек ауруы болса (бүйрекке қан ағымының төмендеуі),
- егер Сізге диализ немесе қан сүзудің кез келген басқа түрі жасалса. Колданылатын жабдыққа байланысты Нолипрел® Аргинин Сізге сәйкес келмейтін препарат болып табылуы мүмкін,
- егер Сізде қандағы калий деңгейі төмен болса,
- егер Сізде емделмеген декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігіне қатысты күдік туындаса (организмдегі судың айқын іркілуі, тыныс алудың қындауы),
- егер Сіз жүрек ырғағының өзгеруіне әкелетін препараттарды қабылдап жүрсөніз ("Басқа препараттар және Нолипрел® Аргинин препараты" қосалқы бөлімін қараңыз),
- егер Сіз жүкті болсаңыз немесе жүктілікті жоспарласаңыз ("Жүктілік және бала емізу" бөлімін қараңыз),
- егер Сіз емізіп жүрсөніз ("Жүктілік және бала емізу" бөлімін қараңыз),
- егер Сіз жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін колданылатын препарат - валсартан + сакубитрил біріктірілімін қабылдап жүрсөніз ("Айрықша нұсқаулар және сақтық шаралары" және "Басқа препараттар және Нолипрел® Аргинин препараты" қосалқы бөлімдерін қараңыз).

Егер Сізде кейбір қанттарға жақпаушылық болса (лактаза жеткіліксіздігі, галактоземия немесе глюкоза-галактоза мальабсорбция синдромы), осы дәрілік препаратты қабылдағанға дейін емдеуші дәрігерге қаралыңыз.

### **Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары**

Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз:

- егер Сізде аорта стенозы болса (жүректен шықкан негізгі қантамырлардың тарылуы), гипертрофиялық кардиомиопатия (жүрек бұлшықетінің ауруы) немесе бүйрек артериясының стенозы (бүйректі қанмен қамтамасыз ететін артерияның тарылуы),
- егер Сізде жүрек жеткіліксіздігі немесе басқа жүрек ауруы болса,
- егер Сізде бүйрек ауруы болса немесе диализ жасалса,
- егер Сізде қандағы альдостерон гормонының деңгейі өте жоғары болса (бастапқы гиперальдостеронизм),
- егер Сізде бауыр функциясының бұзылуы болса,

- егер Сізде жүйелі дәнекер тінінің ауруы болса (дәнекер тінінің зақымдалуымен сипатталатын аурулар тобы), мысалы, жүйелі қызыл жегі немесе склеродермия,
- егер Сізде атеросклероз болса (артериялардың жақтауында олардың санылауын тарылтатын атеросклероздың түйіндақтардың пайда болуы),
- егер Сізде гиперпаратиреоз болса (қалқанша маңы бездерінің функциясының жоғарылауы),
- егер Сізде подагра болса (гиперурикемиямен ауыратын пациенттер)
- егер Сізде гиперкалиемия болса (плазмадағы калийдің мөлшері жоғары),
- егер Сізде гипонатриемия болса (плазмадағы натрийдің мөлшері төмен),
- егер Сізде қант диабеті болса,
- егер Сіз тұз мөлшері төмен диетаны ұстансаныз немесе құрамында калий бар тұз алмастырғыштарды қолдансаныз,
- егер Сіз литий немесе калий сақтайдын препараттарды (спиронолактон, триамтерен) немесе калий қоспаларын қабылдасаңыз, оларды Нолипрел<sup>®</sup> Аргинин препаратымен бір мезгілде қабылдауға болмайды ("Басқа препараттар және Нолипрел<sup>®</sup> Аргинин препараты" қараңыз),
- егер Сіз аллопуринолды, цитостатиктерді (онкологиялық ауруларды емдеуге арналған препараттар) немесе иммунодепрессанттар қабылдасаңыз немесе прокайнамидпен (жүрек ырғағының бұзылуын емдеуге арналған препарат) ем алсаңыз,
- егер сіз алтын препараттарымен ем алсаңыз, қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды, баклофенді, кортикостероидтарды, неприлизин тежегіштерін, QT аралығын ұзартатын препараттарды қабылдап жүрсөніз; жүрек гликозидтері, өмірге қауіпті жүрек аритмиясын туыннатуы мүмкін препараттар ("пируз" типті полиморфты қарыншалық тахикардия),
- егер Сізге сүйек кемігі қан түзуінің төжелуі диагнозы қойылса;
- егер Сіз егде жастағы адам болсаңыз,
- егер Сізде цеброваскулярлық ауру болса,
- егер Сізде реноваскулярлық гипертензия болса,
- егер Сізде артериялық қысымның (АҚ) цифrlары өзгермелі болса (АҚ тұрақсыз жоғарылауы),
- егер Сізде фотосезімталдық реакциялар болса,
- егер Сіз көрү қабілетінің төмендеуіне немесе көздің ауырсынуына тап болсаңыз. Бұл көздің қантамыр қабатында сүйкіткіштің жиналу симптомдары (хориоидальді жалқық) немесе көзге қысымның жоғарылауы болуы мүмкін, бұл Нолипрел<sup>®</sup> Аргинин препаратын қабылдаганнан кейін бірнеше сағат немесе апта ішінде болуы мүмкін. Егер емделмеген болса, бұл көрү қабілетінің қалпына келмеуіне әкелуі мүмкін. Егер Сіз бұрын пенициллинге немесе сульфаниламидке аллергияның болса, оның даму қаупі жоғары болуы мүмкін.
- егер Сізде бет, ерін, ауыз, тіл және тамақ ісінуімен ауыр аллергиялық реакциялар болса, олар жұтылу немесе тыныс алу қындықтарымен бірге жүруі мүмкін (ангионевроздың ісіну). Бұл емдеу кезінде кез келген уақытта пайда болуы мүмкін. Егер Сізде осындай симптомдар пайда болса, **емдеуді тоқтатып, дереу дәрігермен кеңесу керек.**
- егер Сіз жоғары артериялық қысымды емдеу үшін қолданылатын төменде көрсетілген қандай да бір препараттарды қабылдасаңыз:
  - антиотензин II рецепторларының блокаторлары (сартандар ретінде белгілі - мысалы, валсартан, ирбесартан, телмисартан), әсіресе егер Сізде қант диабетімен байланысты бүйрек кінәрраттары болса,
  - алискирен.

Дәрігеріңіз бүйрек функциянызды, артериялық қысымынызды және қандағы электролиттердің (мысалы, калий) мөлшерін үнемі қадағалап отыруы мүмкін. Сондай-ақ, "Колдануға болмайтын жағдайлар" бөліміндегі ақпаратты қараңыз.

- егер сіз қара нәсілге тиістілігіңіз болса, себебі Сізде ангионевроздық ісінудің даму қаупі жоғары болуы мүмкін, сондай-ақ бұл препарат басқа нәсілді пациенттермен салыстырғанда артериялық қысымды төмендетуде аз тиімді болуы мүмкін,
- егер Сіз жоғары өткізгіш жарғақшалармен диализ өтіп жүрсөніз,
- егер Сіз төменде көрсетілген қандай да бір препараттарды қабылдасаңыз, ангионевроздық ісінудің даму қаупі артуы мүмкін:
  - рацекадотрил (диареяны емдеу үшін қолданылады),
  - сиролимус, эверолимус, темсиrolimus және mTOR тежегіштері класына жататын басқа препараттар (трансплантацияланған ағзалардың ажырамай қабылданбауын болдырмау үшін қолданылады),
  - сакубитрил (валсартанмен бекітілген біріктірілімде шығарылады) созылмалы жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылады.

#### *Ангионевроздық ісіну*

АӨФ тежегіштерін, оның ішінде Нолипрел® Аргинин қабылдаған пациенттерде ангионевроздық ісіну (беттің, еріннің, тілдің немесе тамақтың ісінуімен ауыр аллергиялық реакция, жұтыну немесе тыныс алудың қындауы) жағдайлары байқалды. Бұл реакциялар ем кезінде кез келген сәтте басталуы мүмкін. Егер Сізде осы симптомдар пайды болса, Сіз Нолипрел® Аргинин қабылдауды дереу тоқтатып, дереу дәрігерге қаралу керек. 4-бөлімді де қараңыз.

Егер Сіз жүктімін ойласаңыз (немесе жүкті болуды жоспарласаңыз) дәрігерге айтуыныз керек. Нолипрел® Аргинин жүктілік кезінде қабылданбауы тиіс, себебі бұл балаға елеулі зиян келтіруі мүмкін ("Жүктілік және бала емізу" қосалқы бөлімін қараңыз).

*Нолипрел® Аргининің қабылдаған кезде, Сіз өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге немесе медициналық персоналга келесі жағдайлар туралы хабарлауыңыз керек:*

- егер Сізде анестезия және/немесе ауыр хирургиялық операция болса,
- егер Сізде жақында диарея, құсу немесе организмнің сузыздануы байқалса,
- егер Сізге диализді немесе тығыздығы төмен липопротеидердің аферезін жүргізу қажет болса (холестеринді қаннан аппараттың жолмен шығару),
- егер Сіз аралардың немесе баларалардың шағуына аллергиялық реакцияларды азайтатын десенситизациядан өтсөніз,
- егер Сіз құрамында йод бар рентгендік контрасттылы зат (рентген сәулелерімен бүйрек немесе аққазан сияқты ішкі ағзаларды тексеруге мүмкіндік беретін зат) қажет медициналық тексеруден өтсөніз.

Спортшылар Нолипрел® Аргинин препаратының құрамында допинг-бақылау жүргізу кезінде оң реакция бере алатын әсер етуші зат (индаламид) бар екенін білуі тиіс.

#### **Балалар**

Нолипрел® Аргинин препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер болмауына байланысты препаратты 0-ден 18 жасқа дейінгі балаларға берменіз.

#### **Басқа препараттар және Нолипрел® Аргинин препараты**

Емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне Сіз не қабылдағаныңыз, жақында қабылдағаныңыз немесе басқа дәрілік препараттарды қабылдауды бастағаныңыз туралы хабарлаңыз.

Нолипрел® Аргинин препаратын келесі препараттармен бір мезгілде қабылдаудан аулақ болыңыз:

- литий препараттары (мания немесе депрессияны емдеу үшін қолданылады),
- егер Сізде қант диабеті немесе бүйрек функциясының бұзылуы болмаса, алискирен (жоғары артериялық қысымды емдеуге арналған препарат),

- калий сақтайтын диуретиктер (мысалы, триамтерен, спиронолактон, амилорид), калий тұздары, сондай-ақ организмдегі калий мөлшерін арттыратын басқа препараттар (мысалы, гепарин және ко-тrimоксазол, сульфаметоксазол+trimetoprim деп те аталады),
- эстрамустин (онкологиялық жаңа түзілімдерді емдеу кезінде қолданылады),
- жоғары артериялық қысымды емдеуге арналған басқа препараттар: ангиотензин өзгертетін фермент тежегіштері және ангиотензин II рецепторларының блокаторлары.

Нолипрел® Аргинин препаратымен емдеу режиміне басқа препараттарды қабылдау әсер етуі мүмкін. Сіздің дәрігеріңіз дозаны өзгерте алады және/немесе басқа сақтық шараларын қолдана алады. Егер Сіз келесі препараттарды қабылдайтын болсаныз, емдеуші дәрігерге хабарлауды ұмытпаңыз, өйткені оларды қабылдаган кезде ерекше сақ болу керек:

- жоғары артериялық қысымды емдеуде қолданылатын препараттар, соның ішінде ангиотензин II рецепторларының блокаторлары немесе алискирен ("Қолдануға болмайтын жағдайлар" және "Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары" бөлімдеріндегі ақпаратты қараңыз) немесе диуретиктер (бүйрек шығаратын несеп көлемін арттыратын препараттар),
- жүрек жеткіліксіздігін емдеу кезінде қолданылатын калий сақтайтын препараттар: эплеренон және спиронолактон күніне 12,5-тен 50 мг дозада,
- диареяны емдеу үшін (рацекадотрил) немесе трансплантацияланған ағзалардан (сиролимус, зверолимус, темсиролимус және mTOR тежегіштері класына жататын басқа препараттар) қабылданбай ажыраудың алдын алу үшін жиі қолданылатын препараттар. "Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары" деген қосалқы бөлімді қараңыз,
- валсартан+сакубитрил біріктірілімі (созылмалы жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылады). "Қолдануға болмайтын жағдайлар" және "Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары" қосалқы бөлімдерін қараңыз,
- пропофол, севофлуран (анестезия жүргізуге арналған препараттар),
- құрамында йод бар рентгенконтрастылы заттар,
- левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин, ципрофлоксацин, вена ішіне енгізгенде эритромицин, азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спирамицин, ко-тrimоксазол (инфекцияларды емдеу үшін пайдаланылатын антибиотиктер),
- аллопуринол (подагра емдеу үшін),
- мизоластин, терфенадин немесе астемизол (пішен қызбасы немесе аллергияны емдеуге арналған антигистаминдік препараттар),
- ауыр бронх демікпесі мен ревматоидты артритті қоса, әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылатын кортикоидтар,
- аутоиммундық бұзылуарды емдеу үшін немесе қабылданбай ажыраудың алдын алу үшін транспланттау операцияларынан кейін пайдаланылатын иммунодепрессанттар (мысалы, циклоспорин, такролимус),
- галофантрин, лумефантрин, мефлохин, хинин, хлорофил (безгектің кейбір түрлерін емдеу үшін қолданылады),
- пентамидин (пневмонияны емдеу үшін қолданылады),
- натрий ауротиомалаты (инъекциялық алтын препараты) (ревматоидты полиартритті емдеу үшін қолданылады),
- винкамин (егде жастағы пациенттерде, оның ішінде жады жоғалуын симптоматикалық емдеу үшін қолданылады),
- бепридил, ранолазин (жүктемелік стенокардияны емдеу үшін қолданылады),
- вориконазол, итраконазол, кетоконазол, флуконазол (зенге қарсы дәрілер),
- вандетаниб, мышьяк триоксиді, оксалиплатин, такролимус, анагрелид (ісікке қарсы препараттар және иммуномодуляторлар),
- ондансетрон (құсуға қарсы дәрілер),

- алтеплаза (тромболитиктер, тромбқа әсер ету үшін қолданылатын препараттар),
- жүрек ырғағының бұзылуын емдеуге тағайындалған препараттар (мысалы, хинидин, гидрохинидин, прокайнамид, дизопирамид, флексанид, амиодарон, сotalol, дофетилид, ибутилид, бретилий тозилаты, дронедарон),
- цизаприд, дифеманил, домперидон (асқазан-ішек ауруларын емдеу үшін қолданылады),
- дигоксин немесе басқа жүрек гликозидтері (жүрек ауруларын емдеу үшін),
- баклофен (көптеген склероз сияқты ауруларда пайда болатын бұлшықеттердің сіресуін емдеу үшін),
- инсулин, метформин немесе глиптиандер (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) сияқты қант диабетін емдеуге арналған препараттар,
- кальций қоспаларын қоса алғанда, кальций,
- стимуляциялайтын іш жүргізетін дәрілер (мысалы, сенна),
- қабынуға қарсы стероидты емес препараттар (мысалы, ибупрофен) немесе салицилаттардың жоғары дозалары (мысалы, ацетилсалицил қышқылы),
- инъекциялық түрдегі амфотерицин В (ауыр зен ауруларын емдеу үшін),
- депрессия, үрей, шизофрения және т. б. сияқты психикалық бұзылуларды емдеуге арналған препараттар (мысалы, трициклді антидепрессанттар, циталопрам, эсциталопрам сияқты селективті серотонинді кері қармау тежегіштері, психозды емдеуге арналған нейролептиктер, мысалы, хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин, флуфеназин, амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд, галоперидол, дроперидол, пимозид, сертингдол),
- тетракозактид (Крон ауруын емдеу үшін),
- триметоприм (инфекцияны емдеу үшін),
- тамыр кенеятетін препараттар, нитраттарды қоса (қантамырлардың кенеюіне әкелетін препараттар),
- вазопрессин (қант диабетін емдеуге арналған препарат),
- терлипрессин (АІЖ, несеп шығару және жыныс жүйесі ағзаларынан қан кетуді емдеуге арналған препарат),
- кетансерин (вазодилататорлар),
- пробукол (гиполипидемиялық дәрі),
- теродилин (спазмолитик),
- цилостазол (мезгіл-мезгіл ақсақтықты емдеуге арналған препарат).
- тәмен артериялық қысым, шокты немесе демікпені емдеу үшін қолданылатын препараттар (мысалы, эфедрин, норепинефрин немесе адреналин).

### **Жүктілік және бала емізу**

Егер сіз жүкті болсаңыз немесе емізіп журсаңыз, жүкті болсаңыз немесе жүктілікті жоспарласаңыз деп ойласаңыз, препаратты қолданар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кенесініз.

### **Жүктілік**

Егер Сіз жүкті болсаңыз (немесе жүктімін деп ойласаңыз) деп ойласаңыз, емдеуші дәрігерге хабарлауыңыз керек. Әдетте, дәрігер Сізге Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдауды жүктілік басталғанға дейін немесе Сіз жүкті еkenінізді білген бойда бірден тоқтатуға кенес береді. Дәрігер Сізге Нолипрел® Аргинин препаратының орнына басқа препаратты қабылдауға кенес береді. Нолипрел® Аргинин препараты жүктілік кезінде қарсы көрсетілген, өйткені оны қабылдау баланың денсаулығына елеулі зиян келтіруі мүмкін.

### **Бала емізу**

Егер Сіз емшекпен емізетін болсаңыз, Сіз Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдауға болмайды.

Емшекпен емізетін немесе емізуді жоспарлағаның туралы дереу емдеуші дәрігеріңізге хабарлаңыз.  
Дереу емдеуші дәрігеріңізге қаралыңыз.

**Көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу**  
Нолипрел® Аргинин реакция жылдамдығына эсер етпейді, бірақ кейбір пациенттерде артериялық қысымның төмендеуіне байланысты әртүрлі реакциялар, мысалы, бас айналу немесе әлсіздік байқалуы мүмкін. Нәтижесінде көліктерді немесе басқа механизмдерді басқару қабілеті бұзылуы мүмкін.

**Нолипрел® Аргинин препаратының құрамында лактоза моногидраты бар**  
Егер Сізде қанттың кейбір түрлеріне жақпаушылық болса, осы препаратты қолданар алдында емдеуші дәрігеріңізben кеңесініз.

**Нолипрел® Аргинин препаратының құрамында натрий бар**  
Бұл препараттың құрамында бір таблеткаға 1 ммольден az (23 мг) натрий бар, яғни мәні бойынша құрамында натрий жоқ.

### **3. Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдау**

Нолипрел® Аргинин препаратын емдеуші дәрігердің немесе дәріхана қызметкерінің ұсынымдарына толық сәйкес қабылданыз. Күмән болған жағдайда емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз.

#### **Ұсынылатын доза**

Ұсынылатын доза: тәулігіне бір таблетка. Сіздің емдеуші дәрігеріңіз препаратты қабылдау режимін өзгерту мүмкін (мысалы, егер Сізде бүйрек функциясының бұзылуы анықталса).

#### **Қолдану тәсілі**

Ішке, дұрысы таңертең, тамақ ішер алдында. Таблетканы сумен іше отырып, тұтастай жүту керек.

#### **Қолдану ұзактығы**

Эссенциальді гипертензияны емдеуге арналған препараттарды үнемі қабылдау керек.

#### **Егер Сіз Нолипрел® Аргинин препаратын қажет болғаннан артық қабылдаған болсаңыз**

Егер Сіз тым көп таблетка қабылдаған болсаңыз, дереу дәрігерге хабарлаңыз немесе жақын мандағы жедел жәрдем бөліміне хабарласыңыз. Артық дозаланған жағдайда анағұрлым ықтимал симптом - бұл артериялық қысымның төмендеуі болып табылады. Егер Сіздің артериялық қысымыңыз күрт төмендесе (жүрек айнуы, құсу, құрысулар, бас айналуы, үйқышылдық, сананың шатасуы, бүйрек шығаратын несеп көлемінің өзгеруімен қатар жүретін жағдай) жатып, аяғынызды көтеріңіз. Бұл Сіздің жағдайынызды жақсарта алады.

**Егер Сіз Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдауды ұмытып қалсаныз**  
Препаратты күн сайын қабылдау өте маңызды, ейткені қабылдаудың жүйелілігі емдеуді тиімдірек етеді. Дегенмен, егер Сіз Нолипрел® Аргинин препаратының кезекті дозасын қабылдауды ұмытып кетсеңіз, әдеттегі уақытта келесі дозаны қабылданыз. Өткізіп алған дозаны өтеу үшін Нолипрел® Аргинин дәрілік препаратының қосарлы дозасын қабылдамаңыз.

**Егер Сіз Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдауды тоқтатқан болсаңыз**  
Жоғары артериялық қысымды емдеу әдетте үнемі жүргізілетіндіктен, емдеуші дәрігеріңізben алдын ала талқылаусыз Нолипрел® Аргинин дәрілік препаратын қабылдауды тоқтатпаңыз.

Нолипрел® Аргинин препаратын қолдану бойынша сұрақтар болған жағдайда емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне қаралыңыз.

#### **4. Іктинал жағымсыз реакциялар**

Барлық дәрілік препараттар сияқты Нолипрел® Аргинин препараты жағымсыз реакциялар туындауы мүмкін, алайда, олар барлығында байқала бермейді.

**Нолипрел® Аргинин препаратын қабылдауды тоқтатыңыз және келесідей ауыр жағымсыз реакциялардың бірі туындаған жағдайда деруе медициналық көмекке жүгініңіз:**

- төмен артериялық қысымнан туындаған қатты бас айналу немесе естен айырылу (жиі – 10 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- бронх түйілуі (кеудедегі қысылу сезімі, ысқырық дем және ентігу) (жиі емес – 100-адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- беттің, еріннің, ауыздың, тілдің немесе тамақтың ісінуі, тыныс алудың қындауы (ангіоневроздық ісіну) ("Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары" 2-бөлімін қараңыз) (жиі емес – 100 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- эритеманың көп түрін қамтитын терінің ауыр реакциялары (бет, қол немесе аяқтағы қызыл қышитын жерлердің пайда болуынан басталатын тері бөртпесі) немесе қарқынды тері бөртпелері, есекжем, дененің бүкіл беткейіндегі терінің қызаруы, қатты қышыну, құлдіреуіктің пайда болуы, терінің қабыршақтануы және ісінуі, шырышты қабықтың қабынуы (Стивенс — Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз) немесе басқа аллергиялық реакциялар (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- жүрек тарарапынан бұзылулар (жүрек ыргағының бұзылуы (соның ішінде брадикардия, қарыншалық тахикардия, жүрекше фибрилляциясы), стенокардия (дене жүктемесінен туындаған кеуденің, жақтың және арқаның ауыруы), миокард инфарктісі (жүрек ұстамасы) (өте сирек-10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- қолдағы немесе аяқтағы әлсіздік, инсульттің белгісі болуы мүмкін сөйлеу кінэрраттары (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- үйқы безінің қабынуы (панкреатит), ол іштің және арқаның ауыр ауырсынуын тудыруы мүмкін, хал-жағдайдаң нашарлауымен қатар жүреді (өте сирек – 10000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- терінің немесе көз акуыздарының сарғаюы (сарғаю), бұл гепатиттің белгісі болуы мүмкін (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- өмірге қауіп төндіретін аритмия ("пируэт" типті полиморфты қарыншалық тахикардия) (белгісіз – қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес),
- бауыр функциясының бұзылуынан туындаған мидың ауруы (бауыр энцефалопатиясы) (белгісіз – қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес),
- жоғары қысымға байланысты көру қабілетінің төмендеуі немесе көздің ауыруы (көздің тамырлы қабығында сұйықтық жиналуының белгісі (хориоидальді жалқық) немесе жедел жабық бұрышты глаукома (белгісіз - қолда бар мәліметтерге сүйене отырып, пайда болу жиілігін анықтау мүмкін емес).

Пайда болу жиілігі бойынша кему тәртібімен жағымсыз реакциялар мынадай болуы мүмкін:

- **жіңі-10 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:**

аллергиялық және демікпелік реакцияларға бейімділігі бар пациенттердегі тери реакциялары, бас ауыруы, бас айналуы, вертиго, парестезия (аяқ-қолдағы шаншуды сезіну), көрудің бұзылуы, құлақтың зыңылдауы (кулақта шуыл), жөтел, ентігу, ас қорыту жүйесі тарарапынан бұзылыс (жүрек айну, құсу, іштің ауыруы, дисгевзия (дәм сезудің бұрмалануы), диспепсия немесе ас қорытудың қындауы, диарея, іш қату), аллергиялық реакциялар (тері бөртпесі, терінің қышынуы), бұлшықеттің түйілуі, астения;

- **сирек - 1 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:**

көңіл-күйдің өзгеруі (көңіл-күйдің құбылуы), үйқының бұзылуы, есекжем, пурпурा (терідегі қызыл дақтар), пемфигоид (терідегі ошақталған күлдіреуіктің қалыптасуы), бүйрек жеткіліксіздігі (бүйрек функциясының бұзылуы), эректильді дисфункция (импотенция), қатты терлеу (терлеу), эозинофилия (эозинофилдердің жоғарылауы (лейкоциттердің түрі), зертханалық параметрлердің өзгеруі: гиперкалиемия (қандағы калийдің жоғары деңгейі), емді тоқтатқаннан кейін тәмендейді), гипонатриемия (натрийдің тәмен деңгейі); үйқышылдық, естен тану (естен айырылу), жүрек қағысын сезіну (өз жүргегінің қағысын сезіну), тахикардия (жүректің жиі соғуы), диабетпен ауыратын пациенттердегі гипогликемия (қандағы қант деңгейі өте тәмен), васкулит (қантамырлардың қабынуы), ауыз куысының шырышты қабығының құрғауы, фотосезімталдық реакциялары (терінің күнге сезімталдығының жоғарылауы), артralгия (буындардың ауыруы), миалгия (бұлшықет ауыруы), кеуде куысының ауыруы, дімкәстану, шеткөрі ісіну, қызба, қандағы мочевина мен креатинин концентрациясының жоғарылауы, құлау;

- **сирек - 1000 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:**

псориаздың асқынуы (ағымының нашарлауы), зертханалық параметрлердің өзгеруі: "бауыр" ферменттерінің белсенділігінің артуы, гипербилирубинемия (қандағы билирубин концентрациясының жоғарылауы); қатты қажу;

- **өте сирек - 10 000 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:**

сананың шатасуы, эозинофильді пневмония (пневмонияның сирек кездесетін түрі), ринит (мұрынның бітелуі немесе тұмаурату), жедел бүйрек жеткіліксіздігі (бүйрек тарарапынан ауыр бұзылулар); қан тарарапынан лейкоциттер мен эритроциттер санының азауы сияқты бұзылулар: агранулоцитоз, апласттық анемия, панцитопения, лейкопения, нейтропения, гемолиздік анемия, гемоглобин мен эритроциттердің тәмендеуі гематокрит, тромбоцитопения (тромбоциттер санының азауы) гиперкальциемия (қандағы кальцийдің жоғары деңгейі), бауыр функциясының бұзылуы;

- **белгісіз (қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес):**

электрокардиограммадағы (ЭКГ) ауытқулар (QT аралығының ұзаруы), зертханалық параметрлердің өзгеруі: гипокалиемиямен калий мөлшерінің тәмендеуі (калийдің тәмен мөлшері), несеп қышқылы концентрациясының жоғарылауы (несеп қышқылының жоғары деңгейі) және қандағы глюкоза (қандағы қанттың жоғары деңгейі); миопия (алыстан нашар көру), көрудің бұлшығырлануы, Рейно синдромы (қолдағы саусақ пен аяқтары башпайдың үйіп қалуы және ауыруы). Егер Сізде

жүйелі қызыл жегі болса (дәнекер тінінің ауруы), Сіздің жағдайыңыз нашарлауы мүмкін.

Қан, бүйрек, бауыр немесе үйқы безі тараپынан бұзылуы және зертханалық параметрлердің өзгеруі мүмкін (қан талдауында). Сіздің дәрігеріңіз жағдайыңызды бақылау үшін қан талдауын тағайындаі алады.

Несеп концентрациясының жоғарылауы (бұл жағдайда оның күнгірттенуі байқалады), жүрек айну немесе құсу, бұлшықеттің түйілуі, сананың шатасуы және құрысулар АДГ (антидиурездік гормон) жеткіліксіз секрециясынан туындауы мүмкін. Егер Сізде осындай симптомдар болса, мүмкіндігінше тезірек емдеуші дәрігермен байланысыңыз.

### **Жағымсыз реакциялар туралы хабарлама**

Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар болса, емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз. Оларға қосымша паракта көрсетілмеген кез келген жағымсыз реакциялар да жатады. Сіз сондай-ақ дәрілік препараттың жағымсыз реакциялары туралы тікелей хабарлай аласыз (төменде қараңыз). Жағымсыз реакциялар туралы хабарлай отырып, Сіз препараттың қауіпсіздігі туралы көбірек ақпарат алуға көмектесесіз.

### **Ресей Федерациясы**

Денсаулық сақтау саласындағы қадағалау жөніндегі федералдық қызметі  
(Росздравнадзор)

109012, Мәскеу қ., Славян алаңы, 4 үй, күр. 1

Тел: +7 (800) 550 99 03

Эл. пошта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<http://roszdravnadzor.gov.ru>

### **Армения Республикасы**

"Академик Э. Габриелян атындағы дәрілер мен медициналық технологияларды сараптауғылыми орталығы" ЖТАҚ

0051, Ереван қаласы, Комитас даңғылы, 49/5

Тел.: +374 (60) 83 00 73, +374 (10) 23 08 96, +374 (10) 23 16 82

Дәрілер қауіпсіздігін мониторингілеу бөлімінің жедел желі телефоны: +374 (10) 20 05 05, +374 (96) 22 05 05

Эл. пошта: [admin@pharm.am](mailto:admin@pharm.am), [vigilance@pharm.am](mailto:vigilance@pharm.am)

<http://pharm.am>

### **Беларусь Республикасы**

"Денсаулық сақтаудағы сараптама және сынақ орталығы" УК

220037, Минск қ., Товарищеский түйік көш., 2а үй.

Тел.: +375 (17) 231 85 14

Факс.: +375 (17) 252 53 58

Фармакологиялық қадағалау бөлімінің телефоны: + 375 (17) 242 00 29

Эл. пошта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by), [rceth@rceth.by](mailto:rceth@rceth.by)

<http://www.rceth.by>

### **Қазақстан Республикасы**

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау үлттық орталығы" ШЖҚ РМК

010000, Астана қ., Байқоңыр ауданы, А.Иманов көшесі, 13 (БО «Нұрсаulet 2»)

Тел.: +7 (717) 278 99 11

Эл. пошта: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)

<http://www.ndda.kz>

Қырғыз Республикасы

Қырғыз Республикасы Денсаулық сактау министрлігі жанындағы Дәрі-дәрмекпен

қамтамасыз ету және медициналық техника департаменті

720044, Бішкек қаласы, 3-я Линия көшесі, 25

Тел.: +996 (312) 21 92 78

Эл. пошта: [dlsmi@pharm.kg](mailto:dlsmi@pharm.kg)

<http://pharm.kg>

## 5. Нолипрел® Аргинин препаратын сактау

Препаратты баланың қолы жетпейтін жерде, бала көре алмайтын жерде сактаңыз.

Күтыда және картон қорапшасында көрсетілген жарамдылық мерзімі (сактау мерзімі) өткеннен кейін "дейін жарамды" деген сөздерден кейін препаратты қолданбаңыз. Жарамдылық мерзімі аталған айдың соңғы күні болып табылады.

30°C-ден аспайтын температурада сактау керек.

Препаратты көрізге немесе тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Дәріхана қызметкерінен енді қажет емес препаратты қалай утилизациялау (жою) керектігін анықтап алыңыз. Бұл шаралар қоршаған ортаны корғауға мүмкіндік береді.

## 6. Қаптаманың ішіндегісі және өзге де мәліметтер

### Нолипрел® Аргинин препаратының құрамында

Индапамид және периндоприл аргинині әсер етуші заттар болып табылады.

Улбірлі қабықпен қапталған әрбір таблетканың құрамында 0,625 мг индапамид және 2,5

мг периндоприл аргинин бар (периндоприл негізінің 1,6975 мг сай келеді).

Басқа ингредиенттер (қосымша заттар) лактоза моногидраты, магний стеараты,

мальтодекстрин, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы, натрий

карбоксиметилкрахмалы (А типі), глицерол, гипромеллоза, макрогол 6000, магний

стеараты, титанның қостотығы (Е171) болып табылады.

### Нолипрел® Аргинин препаратының сыртқы түрі және қаптамасының ішіндегісі

Улбірлі қабықпен қапталған таблеткалар.

Препарат ұзынша, екі жағында сызығы бар, ақ түсті улбірлі қабықпен қапталған таблеткалар болып табылады. Сындыру сызығы (сызық) таблетканы бөлуге арналмаған.

"Лаборатории Сервье Индастри" өндіріс кезінде, Франция:

14 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған күтыда.

Жабдықталған полипропиленнен жасалған күтыда. 1 күтыдан (14 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парақпен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қаптама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған күтыда.

3 күтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парақтың төң санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

"Лаборатории Сервье Индастри", Франция өндіру және өлишеп-оралу/ бұынп-тую "СЕРВЬЕ РУС" ЖШК, Ресей кезінде:

14 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (14 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парапен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қантама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парапен тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

"СЕРВЬЕ РУС" ЖШК, Ресей өндіріс кезінде:

14, 29 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (14, 29 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парапен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қантама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-параптың тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

"Лаборатории Сервье Индастри", Франция және өндіру және өлишеп-оралу /бұынп-тую

«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд», Ирландия кезінде:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парапен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қантама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-параптың тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

**Тіркеу куәлігінің ұстаушысы**

«Лаборатории Сервье»/Les Laboratoires Servier  
92284 Франция, Сюрен Седекс, Карно көш., 50/  
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France,

**Өндіруші**

**"СЕРВЬЕ РУС" ЖШК**

108828 Ресей, Мәскеу қ., Краснопахорское кенті, 158 квартал, 2 иелік, 1 құр.  
немесе

"Лаборатории Сервье Индастри" / Les Laboratoires Servier Industrie  
905, Саран тас жолы, 45520 Жиди, Франция/905, route de Saran, 45520 Gidy, France  
немесе

«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд»/Servier (Ireland) Industries Ltd  
Графство Уиклоу, Аркллоу, Гори роуд, Манилендс, Y14 E284, Ирландия/  
Co. Wicklow, Arklow, Gorey Road, Moneylands, Y14 E284, Ireland

Препарат туралы кез келген ақпарат алу үшін тіркеу куәлігін ұстаушысының өкіліне жүргіну қажет:

Ресей Федерациясы

"Сервье" АҚ

Мекенжайы: 125196, Мәскеу қ., Лесная көш., 7 үй, 7/8/9 қабат

Тел.: +7 (495) 937 07 00

Факс: +7 (495) 937 07 01

Эл. пошта: [servier.russia@servier.com](mailto:servier.russia@servier.com)

Армения Республикасы

"Лаборатории Сервье" өкілдігі

Мекенжай: 0002, Ереван қаласы, Амирян көшесі, 15, 100-ші дүкен, Кентрон

Тел.: +374 (10) 50 50 74

Эл. пошта: [mariam.antonyan@servier.com](mailto:mariam.antonyan@servier.com)

Беларусь Республикасы

Беларусь Республикасындағы "Les Laboratoires Servier" АҚ өкілдігі (Франция Республикасы)

Мекенжайы: 220030, Минск қ., Мясников көшесі, 70, кеңсе, 303

Тел.: +375 (17) 306 54 55/56

Эл. пошта: [officeBY@servier.com](mailto:officeBY@servier.com)

Қазақстан Республикасы және Қырғыз Республикасы

"Сервье Қазақстан" ЖШС

Мекенжайы: 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 310Г

Тел.: +7 (727) 386 76 62

Эл. пошта: [kazadinfo@servier.com](mailto:kazadinfo@servier.com)

**Қосымша парақ қайта қаралды**

**Басқа ақпарат көздері**

Препарат туралы толық мәліметтер Одақтың веб-сайтында

<http://eec.eaeunion.org>.

Қосымша парақ Одақтың веб-сайтында Одақтың барлық тілдерінде қолжетімді.