

Листок-вкладыш – информация для пациента

Нолипрел® Форте Аргинин, 1,25 мг+5 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующие вещества: индапамид+периндоприла аргинин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Нолипрел® Форте Аргинин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Нолипрел® Форте Аргинин.
3. Прием препарата Нолипрел® Форте Аргинин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Нолипрел® Форте Аргинин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Нолипрел® Форте Аргинин, и для чего его применяют

Препарат Нолипрел® Форте Аргинин содержит комбинацию двух действующих веществ: индапамида и периндоприла аргинина. Данный препарат относится к фармакотерапевтической группе под названием: «Гипотензивные средства комбинированные» и применяется для лечения артериальной гипертензии (снижения повышенного артериального давления).

Индапамид является диуретическим (мочегонным) средством и снижает артериальное давление. В отличие от других диуретиков, индапамид при приеме в рекомендованных дозах незначительно увеличивает объем мочи, вырабатываемой почками. Кроме того, индапамид увеличивает растяжимость (эластичность) крупных артерий и уменьшает сопротивление периферических артерий малого диаметра, что также способствует снижению артериального давления.

Периндоприл принадлежит к классу препаратов, которые называются ингибиторами аngiotenzinпревращающего фермента (АПФ). Его действие приводит к расширению кровеносных сосудов, снижению сопротивления периферических артерий, улучшению работы миокарда (сердечной мышцы) и снижению нагрузки на сердце. Одновременный прием индапамида и периндоприла аргинина усиливает действие каждого из них на артериальное давление.

Показания к применению

Препарат Нолипрел® Форте Аргинин показан к применению у взрослых:

- для лечения эссенциальной гипертензии;

- у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа для снижения риска развития микрососудистых осложнений (со стороны почек) и макрососудистых осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях.

2. О чём следует знать перед приемом препарата Нолипрел® Форте Аргинин

Противопоказания

Не принимайте препарат Нолипрел® Форте Аргинин:

- если у Вас аллергия на индапамид или любой другой сульфонамид, периндоприл или любой другой ингибитор АПФ, или любые другие компоненты данного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша),
- если раньше у Вас при приеме других ингибиторов АПФ развивались такие симптомы, как свистящее дыхание, отек лица или языка, интенсивный зуд или тяжелая кожная сыпь (ангионевротический отек), или у одного из Ваших родственников отмечались такие симптомы при каких-либо обстоятельствах,
- если Вы принимаете препарат для снижения артериального давления, содержащий алискирен, и при этом у Вас есть сахарный диабет или нарушение функции почек,
- если у Вас имеется нарушение функции почек, связанное с диабетом, и Вы принимаете препараты блокаторы рецепторов ангиотензина II,
- если у Вас имеется тяжелое заболевание печени или печеночная энцефалопатия (потенциально обратимое нарушение функции головного мозга в результате печеночной недостаточности),
- если у Вас тяжелое заболевание почек, которое может включать стеноз почечной артерии (снижение притока крови к почкам),
- если Вам проводится диализ или любой другой тип фильтрации крови. В зависимости от используемого оборудования, Нолипрел® Форте Аргинин может оказаться не подходящим для Вас препаратом,
- если у Вас низкий уровень калия в крови,
- если у Вас имеется подозрение на нелеченую декомпенсированную сердечную недостаточность (выраженная задержка воды в организме, затрудненное дыхание),
- если Вы принимаете препараты, способные вызвать изменение сердечного ритма (см. подраздел «Другие препараты и препарат Нолипрел® Форте Аргинин»),
- если Вы беременны или планируете беременность (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»),
- если Вы кормите грудью (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»),
- если Вы принимаете комбинацию валсартан + сакубитрил – препарат, применяемый для лечения сердечной недостаточности (см. подразделы «Особые указания и меры предосторожности» и «Другие препараты и препарат Нолипрел® Форте Аргинин»).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Нолипрел® Форте Аргинин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас стеноз аорты (сужение главного кровеносного сосуда, идущего от сердца), гипертрофическая кардиомиопатия (заболевание сердечной мышцы) или стеноз почечной артерии (сужение артерии, снабжающей кровью почки),
- если у Вас сердечная недостаточность или другое заболевание сердца,
- если у Вас заболевание почек или Вам проводится диализ,
- если у Вас аномально повышенный уровень гормона альдостерона в крови (первичный гиперальдостеронизм),
- если у Вас нарушение функции печени,

- если у Вас системное заболевание соединительной ткани (группа заболеваний, характеризующаяся поражением соединительной ткани), такое как системная красная волчанка или склеродермия,
- если у Вас атеросклероз (образование атеросклеротических бляшек в стенках артерий, сужающих их просвет),
- если у Вас гиперпаратиреоз (повышение функции паращитовидных желез),
- если у Вас подагра (пациенты с гиперурикемией),
- если у Вас гиперкалиемия (повышенное содержание калия в плазме),
- если у Вас гипонатриемия (сниженное содержание натрия в плазме),
- если у Вас сахарный диабет,
- если Вы соблюдаете диету с пониженным содержанием соли или принимаете заменители соли, содержащие калий,
- если Вы принимаете литий или калийсберегающие препараты (спиронолактон, триамтерен) или калиевые добавки, так как не следует принимать их одновременно с препаратом Нолипрел® Форте Аргинин (см. «Другие препараты и препарат Нолипрел® Форте Аргинин»),
- если Вы принимаете аллопуринол, цитостатики (препараты для лечения онкологических заболеваний) или иммунодепрессанты или получаете терапию прокаинамидом (препарат для лечения нарушений ритма сердца),
- если Вы получаете терапию препаратами золота, принимаете нестероидные противоспалительные препараты (НПВП), баклофен, кортикоステроиды, ингибиторы неприлизина, препараты, которые могут вызвать удлинение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ); сердечные гликозиды; препараты, которые могут вызвать жизнеугрожающие нарушения ритма сердца (полиморфную желудочковую тахикардию типа «пирамиды»),
- если у Вас диагностировано угнетение костномозгового кроветворения;
- если Вы – человек пожилого возраста,
- если у Вас цереброваскулярное заболевание,
- если у Вас реноваскулярная гипертензия,
- если у Вас лабильные цифры артериального давления (нестойкое повышение артериального давления),
- если у Вас наблюдались реакции фоточувствительности,
- если у Вас аллергическая реакция на пенициллин в анамнезе,
- если Вы испытываете снижение зрения или боль в глазах. Это могут быть симптомы скопления жидкости в сосудистом слое глаза (хориоидальный выпот) или повышение давления в глазу, что может произойти в течение нескольких часов или недель после приема препарата Нолипрел® Форте Аргинин. При отсутствии лечения это может привести к необратимой потере зрения. Если у Вас ранее была аллергия на пенициллин или сульфаниламиды, у Вас может быть повышенный риск ее развития.
- если у Вас наблюдались серьезные аллергические реакции с отеком лица, губ, рта, языка и горла, которые могли сопровождаться затруднением глотания или дыхания (ангионевротический отек). Такое может возникнуть в любое время во время лечения. Если у Вас развились такие симптомы, Вы должны прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, используемых для лечения высокого артериального давления:
 - блокаторы рецепторов ангиотензина II (также известные как сартаны - например, валсартан, ирбесартан, телмисартан), особенно если у Вас есть связанные с сахарным диабетом проблемы с почками,
 - алискирен.

Ваш врач может проводить регулярный контроль функции почек, артериального давления и содержания электролитов (например, калия) в крови.

Смотрите также информацию, приведенную в разделе «Противопоказания».

- если Вы принадлежите к негроидной расе, так как Вы можете быть подвержены более высокому риску развития ангионевротического отека, а также этот препарат может быть менее эффективен в снижении артериального давления в сравнении с пациентами другой расовой принадлежности,
- если Вы проходите диализ с высокопроницаемыми мембранами,
- если Вы принимаете какой-либо из нижеперечисленных препаратов, риск развития ангионевротического отека может повыситься:
 - рацефадотрил (используется для лечения диареи),
 - сиролимус, эверолимус, темсиrolimus и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTor (используются для предотвращения отторжения пересаженных органов),
 - сакубитрил (выпускается в фиксированной комбинации с валсартаном), применяющийся для лечения хронической сердечной недостаточности.

Ангионевротический отек

Случаи ангионевротического отека (серезной аллергической реакции с отеком лица, губ, языка или горла, затруднением глотания или дыхания) были отмечены у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, в том числе и Нолипрел® Форте Аргинин. Эти реакции могут наступить в любой момент во время терапии. Если у Вас появились данные симптомы, Вы должны немедленно прекратить прием Нолипрел® Форте Аргинин и обратиться к врачу. Смотрите также раздел 4.

Вы должны сказать Вашему врачу, если Вы думаете, что беременны (или планируете забеременеть). Нолипрел® Форте Аргинин не должен приниматься во время беременности, так как это может причинить серьезный вред ребенку (смотрите подраздел «Беременность и грудное вскармливание»).

Когда Вы принимаете Нолипрел® Форте Аргинин, Вы должны также проинформировать Вашего лечащего врача или медицинский персонал о следующих ситуациях:

- если Вам предстоит анестезия и/или серьезная хирургическая операция,
- если у Вас недавно наблюдались диарея, рвота или обезвоживание организма,
- если Вам необходимо проводить диализ или аферез липопротеинов низкой плотности (аппаратное выведение холестерина из крови),
- если Вы проходите десенситизацию, которая должна уменьшить аллергические реакции на укусы пчел или ос,
- если Вы проходите медицинское обследование, для которого требуется введение йодосодержащего рентгеноконтрастного вещества (вещества, которое делает возможным обследование внутренних органов, например, почек или желудка, с помощью рентгеновских лучей),
- если у Вас наблюдаются изменения зрения или боли в одном или обоих глазах при применении препарата Нолипрел® Форте Аргинин. Это может быть признаком развития глаукомы, повышенного давления в глазу(ах). Вы должны прекратить прием препарата Нолипрел® Форте Аргинин и обратиться к врачу.

Спортсмены должны знать, что препарат Нолипрел® Форте Аргинин содержит действующее вещество (индапамид), которое может дать положительную реакцию при проведении допинг-контроля.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет в связи с тем, что данные об эффективности и безопасности препарата Нолипрел® Форте Аргинин отсутствуют.

Другие препараты и препарат Нолипрел® Форте Аргинин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Избегайте одновременного приема препарата Нолипрел® Форте Аргинин со следующими препаратами:

- препараты лития (используется для лечения мании или депрессии),
- алискирен (препарат для лечения повышенного артериального давления), если у Вас нет сахарного диабета или нарушения функции почек,
- калийсберегающие диуретики (например, триамтерен, спиронолактон, амилорид), калиевые соли, а также другие препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме (например, гепарин и ко-тритомоксазол, также известный как сульфаметоксазол+триметоприм),
- эстромустин (применяется при лечении онкологических новообразований),
- другие препараты для лечения повышенного артериального давления: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II.

На лечение препаратом Нолипрел® Форте Аргинин может повлиять прием других препаратов. Ваш врач может изменить дозу и/или предпринять другие меры предосторожности. Обязательно поставьте в известность своего лечащего врача, если Вы принимаете следующие препараты, так как при их приеме следует соблюдать особую осторожность:

- препараты, которые используются при лечении повышенного артериального давления, включая блокаторы рецепторов ангиотензина II или алискирен (см. также информацию, приведенную в подразделах «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»), или диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками),
- калийсберегающие препараты, применяемые при лечении сердечной недостаточности: эплеренон и спиронолактон в дозах от 12,5 до 50 мг/день,
- препараты, которые наиболее часто используются для лечения диареи (рацекадотрил) или для предупреждения отторжения трансплантированных органов (сиrolimus, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR). См. подраздел «Особые указания и меры предосторожности»,
- комбинация валсартан+сакубитрил (применяемая для лечения хронической сердечной недостаточности). См. подразделы «Противопоказания» и «Особые указания и меры предосторожности»,
- пропофол, севофлуран (препараты для проведения анестезии),
- йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества,
- левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин, ципрофлоксацин, эритромицин при внутривенном введении, азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спирамицин, ко-тритомоксазол (антибиотики, которые используются для лечения инфекций),
- аллопуринол (для лечения подагры),
- мизоластин, терфенадин или астемизол (антигистаминные препараты для лечения сенной лихорадки или аллергии),
- кортикоステроиды, которые используются для лечения различных заболеваний, включая тяжелую бронхиальную астму и ревматоидный артрит,
- иммунодепрессанты, которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус),
- галофантрин, лумефантрин, мефлохин, хинин, хлорофил (используются для лечения некоторых видов малярии),

- пентамидин (используется для лечения пневмонии),
- ауротиомалат натрия (инъекционный препарат золота) (используется для лечения ревматоидного полиартрита),
- винкамин (используется для симптоматического лечения когнитивных нарушений у пожилых пациентов, включая потерю памяти),
- бепридил, ранолазин (используются для лечения стенокардии напряжения),
- вориконазол, итраконазол, кетоконазол, флуконазол (противогрибковые средства),
- вандетаниб, мышьяка триоксид, оксалиплатин, таクロнимус, анагрелид (противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы),
- ондансетрон (противорвотные средства),
- алтеплаза (тромболитики, препараты, применяющиеся для воздействия на тромб),
- препараты, назначаемые при лечении нарушений сердечного ритма (например, хинидин, гидрохинидин, прокаинамид, дизопирамид, флекаинид, амиодарон, сotalол, дофетилид, изотицилд, бретилия тозилат, дронедарон),
- цизаприд, дифеманил, домперидон (используются для лечения желудочно-кишечных расстройств),
- дигоксин или другие сердечные гликозиды (для лечения сердечных заболеваний),
- баклофен (для лечения ригидности мышц, возникающей при таких заболеваниях, как рассеянный склероз),
- препараты для лечения сахарного диабета, такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин),
- кальций, включая добавки кальция,
- стимулирующие слабительные (например, сenna),
- нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибuproфен) или высокие дозы салицилатов (например, ацетилсалициловая кислота),
- амфотерицин В в инъекционной форме (для лечения серьезных грибковых заболеваний),
- препараты для лечения психических нарушений, таких как депрессия, тревога, шизофрения и др. (например, трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы захвата серотонина, такие как циталопрам, эсциталопрам; нейролептики для лечения психоза, такие как хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлуоперазин, флуфеназин, амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд, галоперидол, дроперидол, пимозид, сертиндол),
- тетракозактид (для лечения болезни Крона),
- триметопrim (для лечения инфекций),
- сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (препараты, вызывающие расширение кровеносных сосудов),
- вазопрессин (препарат для терапии несахарного диабета),
- терлипрессин (препарат для терапии кровотечений из желудочно-кишечного тракта, органов мочевыделительной и половой системы),
- кетансерин, нитроглицерин (вазодилататор),
- пробукол (гиполипидемическое средство),
- теродилин (спазмолитик),
- циостазол (препарат для терапии перемежающейся хромоты),
- препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Вы должны проинформировать своего лечащего врача, если думаете, что беременны (или можете забеременеть). Как правило, врач посоветует Вам прекратить прием препарата Нолипрел® Форте Аргинин до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнаете, что беременны. Врач посоветует Вам принимать другой препарат вместо препарата Нолипрел® Форте Аргинин. Препарат Нолипрел® Форте Аргинин противопоказан во время беременности, так как его прием может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Грудное вскармливание

Вы не должны принимать Нолипрел® Форте Аргинин если Вы кормите грудью. Немедленно сообщите своему лечащему врачу о том, что Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Немедленно обратитесь к своему лечащему врачу.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нолипрел® Форте Аргинин не влияет на скорость реакции, но у некоторых пациентов из-за пониженного артериального давления могут проявиться различные реакции, например, головокружение или слабость. В результате способность управлять транспортами средствами или другими механизмами может быть нарушена.

Препарат Нолипрел® Форте Аргинин содержит лактозы моногидрат

Если у Вас имеется непереносимость некоторых видов сахаров, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед приемом данного препарата.

Препарат Нолипрел® Форте Аргинин содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

3. Прием препарата Нолипрел® Аргинин Форте

Всегда принимайте препарат Нолипрел® Форте Аргинин в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Рекомендуемая доза: одна таблетка в сутки. Ваш лечащий врач может изменить режим приема препарата (например, если у Вас выявлено нарушение функции почек).

Способ применения

Внутрь, предпочтительно утром, перед приемом пищи. Таблетку следует проглатывать целиком, запивая водой.

Продолжительность применения

Препараты для лечения артериальной гипертензии должны приниматься постоянно.

Если Вы приняли препарата Нолипрел® Форте Аргинин больше, чем следовало
Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Наиболее вероятным симптомом в случае передозировки является снижение артериального давления. Если у Вас резко снизилось артериальное давление (состояние, сопровождающееся тошнотой, рвотой, судорогами, головокружением, сонливостью,

спутанностью сознания, изменением объема мочи, выделяемого почками), примите горизонтальное положение и приподнимите ноги. Это может улучшить Ваше состояние.

Если Вы забыли принять препарат Нолипрел® Форте Аргинин

Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять очередную дозу препарата Нолипрел® Форте Аргинин, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу лекарственного препарата Нолипрел® Форте Аргинин, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили принимать препарат Нолипрел® Форте Аргинин

Поскольку лечение повышенного артериального давления обычно проводится постоянно, не прекращайте прием лекарственного препарата Нолипрел® Форте Аргинин без предварительного обсуждения с Вашим лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата Нолипрел® Форте Аргинин, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Нолипрел® Форте Аргинин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Нолипрел® Форте Аргинин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одной из следующих серьезных нежелательных реакций:

- сильное головокружение или потеря сознания, вызванные низким артериальным давлением (часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10),
- бронхоспазм (чувство сжатия в груди, свистящее дыхание и одышка) (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100),
- отек лица, губ, рта, языка или горла, затрудненное дыхание (англоневротический отек) (см. раздел 2 «Особые указания и меры предосторожности») (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100),
- тяжелые кожные реакции, включающие многоформную эритему (кожная сыпь, часто начинающаяся с появления красных зудящих участков на лице, руках или ногах) или интенсивные кожные высыпания, крапивницу, покраснение кожи на всей поверхности тела, сильный зуд, возникновение пузьрей, шелушение и отек кожи, воспаление слизистых оболочек (Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз) или другие аллергические реакции (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- нарушения со стороны сердца (нарушения ритма сердца (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий), стенокардия (боли в груди, челюсти и спине, вызванные физической нагрузкой), инфаркт миокарда (сердечный приступ)) (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- слабость в руках или ногах, проблемы с речью, что может являться признаком инсульта (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое может вызвать серьезные боли в животе и спине, сопровождающиеся плохим самочувствием (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),
- покалывание кожи или белков глаз (желтуха), что может являться признаком гепатита (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000),

- угрожающая жизни аритмия (полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт») (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно),
- заболевание головного мозга, вызванное нарушением функции печени (печеночная энцефалопатия) (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно),
- снижение зрения или боль в глазах из-за высокого давления (возможные признаки скопления жидкости сосудистой оболочки глаза (хориоидальный выпот) (неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно).

В порядке убывания по частоте возникновения, нежелательные реакции могут быть следующими:

- часто - могут возникать не более чем у 1 человека из 10:

кожные реакции у пациентов с предрасположенностью к аллергическим и астматическим реакциям, головная боль, головокружение, вертиго, парестезия (ощущение покалывания в конечностях), нарушение зрения, звон в ушах (ощущение шума в ушах), кашель, одышка, нарушение со стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия (искажение вкусовых ощущений), диспепсия или затрудненное пищеварение, диарея, запор), аллергические реакции (такие как кожная сыпь, кожный зуд), спазм мышц, астения (ощущение усталости);

- нечасто - могут возникать не более чем у 1 человека из 100:

перепады настроения (лабильность настроения), нарушение сна, крапивница, пурпурра (красные точечные пятна на коже), пемфигоид (очаговое образование волдырей на коже), почечная недостаточность (нарушение функции почек), эректильная дисфункция (импотенция), повышенное потоотделение (потливость), повышенное содержание эозинофилов (вид лейкоцитов), изменение лабораторных параметров: гиперкалиемия (высокий уровень калия в крови), снижающаяся после прекращения терапии, гипонатриемия (низкий уровень натрия); сонливость, обморок (потеря сознания), ощущение сердцебиения (ощущение биения собственного сердца), тахикардия (учащенное сердцебиение), гипогликемия (очень низкий уровень сахара в крови) у пациентов, страдающих диабетом, васкулит (воспаление кровеносных сосудов), сухость слизистой оболочки полости рта, реакции фоточувствительности (повышенная чувствительность кожи к солнцу), артralгия (боль в суставах), миалгия (боль в мышцах), боль в грудной клетке, недомогание, периферический отек, лихорадка, повышение концентрации мочевины и креатинина в крови, падение;

- редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 1000:

обострение (ухудшение течения) psoriasis, изменения лабораторных параметров: повышенная активности «печеночных» ферментов, гипербилирубинемия (повышение концентрации билирубина в крови); повышенная утомляемость;

- очень редко - могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000:

спутанность сознания, эозинофильная пневмония (редкий тип пневмонии), ринит (заложенность носа или насморк), острые почечные недостаточности (тяжелые нарушения со стороны почек); нарушения со стороны крови, такие как уменьшение количества лейкоцитов и эритроцитов: агранулоцитоз, апластическая анемия, панцитопения, лейкопения, нейтропения, гемолитическая анемия, снижение

гемоглобина и гематокрита, тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов), гиперкальциемия (высокий уровень кальция в крови), нарушение функции печени;

- неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

отклонения (удлинение интервала QT) на электрокардиограмме (ЭКГ), изменение лабораторных параметров: снижение концентрации калия с гипокалиемией (низкое содержание калия в крови), повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в крови; миопия (близорукость), нечеткость зрения, нарушение зрения, синдром Рейно (онемение и боль в пальцах рук и ног). Если у Вас системная красная волчанка (вид заболевания соединительной ткани), Ваше состояние может ухудшиться.

Могут возникать нарушения со стороны крови, почек, печени или поджелудочной железы и изменения лабораторных параметров (в анализах крови). Ваш лечащий врач может назначить проведение анализа крови для контроля Вашего состояния.

Повышение концентрации мочи (при этом отмечается ее потемнение), тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания и судороги могут быть вызваны неадекватной секрецией АДГ (антидиуретического гормона). Если у Вас возникли такие симптомы, свяжитесь с Вашим лечащим врачом как можно скорее.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях лекарственного препарата напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Тел: +7 (800) 550 99 03

Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru <http://roszdravnadzor.gov.ru>

Республика Армения

АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна»

0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

Тел.: +374 (60) 83 00 73, +374 (10) 23 08 96, +374 (10) 23 16 82

Телефон горячей линии отдела мониторинга безопасности лекарств: +374 (10) 20 05 05, +374 (96) 22 05 05

Эл. почта: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am
<http://pharm.am>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а.

Тел.: +375 (17) 231 85 14

Факс.: +375 (17) 252 53 58

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242 00 29

Эл. почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконур, А.Иманова, 13 (БЦ «Нурсаulet 2»)
Тел.: +7 (717) 278 99 11
Эл. почта: farm@dari.kz
<http://www.ndda.kz>

Кыргызская Республика
Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве
Здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Тел.: +996 (312) 21 92 78
Эл. почта: dlsmi@pharm.kg
<http://pharm.kg>

5. Хранение препарата Нолипрел® Форте Аргинин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке после слов «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Нолипрел® Форте Аргинин содержит

- Действующими веществами являются индапамид и периндоприла аргинин. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: 1,25 мг индапамида и 5 мг периндоприла аргинина (соответствует 3,395 мг основания периндоприла).
- Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, магния стеарат, мальтодекстрин, кремния диоксид коллоидный безводный, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), глицерол, гипромеллоза, макрогол 6000, магния стеарат, титана диоксид (E171).

Внешний вид препарата Нолипрел® Форте Аргинин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Препарат представляет собой продолговатые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета.

При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция

По 14 или 30 таблеток во флаконе из полипропилена, снабженном дозатором и пробкой,

содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция и фасовке/упаковке на ООО «СЕРВЬЕ РУС», Россия:

По 14 или 30 таблеток во флаконе из полипропилена, снабженном дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флаконе из полипропилена, снабженном дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

При производстве на «ООО «СЕРВЬЕ РУС», Россия:

По 14, 29 или 30 таблеток во флаконе из полипропилена, снабженном дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 14, 29 или 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флаконе из полипропилена, снабженном дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель. По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

При производстве на «Лаборатории Сервье Индастри», Франция и расфасовке/упаковке на «Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд», Ирландия:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 1 флакону (по 30 таблеток) с листком-вкладышем в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Упаковка для стационаров:

По 30 таблеток во флакон из полипропилена, снабженный дозатором и пробкой, содержащей влагопоглощающий гель.

По 3 флакона (по 30 таблеток) с равным количеством листков-вкладышей в пачке картонной с контролем первого вскрытия.

Держатель регистрационного удостоверения
«Лаборатории Сервье»/Les Laboratoires Servier
92284 Франция, Сюрен Седекс, ул. Карно 50/
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France,

Производитель

ООО «СЕРВЬЕ РУС»

108828 Россия, г. Москва, поселение Краснопахорское, квартал 158, владение 2, стр. 1
или

«Лаборатории Сервье Индастри»/Les Laboratoires Servier Industrie
905, шоссе Саран, 45520 Жиди, Франция/905, route de Saran, 45520 Gidy, France
или
«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд»/Servier (Ireland) Industries Ltd
Графство Уиклоу, Арклоу, Гори роуд, Манилендс, Y14 E284, Ирландия/
Co. Wicklow, Arklow, Gorey Road, Moneylands, Y14 E284, Ireland
За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю
держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

АО «Сервье»
Адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 7/8/9
Тел.: +7 (495) 937 07 00
Факс: +7 (495) 937 07 01
Эл. почта: servier.russia@servier.com

Республика Беларусь

Представительство УАО «Les Laboratoires Servier» (Французская Республика) в
Республике Беларусь
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70, оф. 303
Тел.: +375 (17) 306 54 55/56
Эл. почта: officeBY@servier.com

Республика Армения

Представительство «Лаборатории Сервье»
Адрес: 0002, г. Ереван, улица Амиряна, 15, магазин 100, Кентрон
Тел.: +374 (10) 50 50 74
Эл. почта: mariam.antonyan@servier.com

Республика Казахстан и Кыргызская Республика

ТОО «Сервье Казахстан»
Адрес: 050020, г. Алматы, пр. Достык 310Г
Тел.: +7 (727) 386 76 62
Эл. почта: kazadinfo@servier.com

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org>.

Листок-вкладыш доступен на всех языках Союза на веб-сайте Союза.

Қосымша парақ - пациентке арналған ақпарат

Нолипрел® Форте Аргинин, 1,25 мг+5 мг, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар
Әсер етуші заттар: индапамид+периндоприл аргинині

Препаратты қабылдар алдында қосымша парақты толығымен оқып шығыңыз, себебі мұнда Сіз үшін маңызды мәліметтер қамтылған.

- Қосымша парақты сақтап қойыңыз. Сізге оны қайтадан оқу қажет болуы мүмкін.
- Егер Сізде қосымша сұрақтар туындаса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызыметкеріне хабарласыңыз.
- Препарат нақты Сізге тағайындалған. Оны басқа адамдарға бермеңіз. Ол олардың ауру симптомдары Сіздікіне сәйкес келсе де, оларға зиян тигізуі мүмкін.
- Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар пайда болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызыметкеріне хабарласыңыз. Бұл ұсыным кез келген ықтимал жағымсыз реакцияларға, оның ішінде қосымша парақтың 4-бөлімінде атап көрсетілмеген реакцияларға қолданылады.

Қосымша парақтың мазмұны

1. Нолипрел® Форте Аргинин препараты дегеніміз не және ол не үшін қолданылады.
2. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдар алдында нені білу керек.
3. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдау.
4. Үкітимал жағымсыз реакциялар.
5. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдау.
6. Қаптаманың ішіндегісі және өзге де мәліметтер.

1. Нолипрел® Форте Аргинин препараты дегеніміз не және ол не үшін қолданылады

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының құрамында екі әсер етуші заттың біріктірілімі бар: индапамид және периндоприл аргинині. Бұл препарат "Гипотензивті біріктірілген дәрілер" деп аталатын фармакотерапиялық топқа жатады және артериялық гипертензияны емдеу үшін қолданылады (жоғары артериялық қысымды төмендету).

Индапамид диурездік (несеп айдайтын) дәрі болып табылады және артериялық қысымды төмендетеді. Басқа диуретиктерден айырмашылығы, индапамид ұсынылған дозаларда қабылдаған кезде бүйрекпен шығаратын несеп көлемін шамалы арттырады. Сонымен қатар, индапамид үлкен артериялардың созылуын (серпімділігін) арттырады және кіші диаметрлі шеткегі артериялардың кедергісін азайтады, бұл артериялық қысымды төмендетуге көмектеседі.

Периндоприл ангиотензин өзгеретін фермент тежегіштері (АТФ) деп аталатын препараттар класына жатады. Оның әсері қантамырлардың кенеюіне, шеткегі артериялар кедергісінің төмендеуіне, миокардтың (жүрек бұлышықетінің) жақсаруына және жүрек жүктемесінің төмендеуіне әкеледі.

Индапамид пен периндоприл аргининің бір мезгілде қабылдау олардың әрқайсысының артериялық қысымға әсерін күштейтеді.

Қолданылуы

Нолипрел® Форте Аргинин препараты ересектерде қолдануға арналған.

- эссенциальді гипертензияны емдеу үшін;
- артериялық гипертензияға және 2 типті қант диабетіне шалдыққан пациенттерде жүрек-қантамыр аурулары кезінде микротамырлық асқынулардың (бүйрек тарапынан) және макротамырлық асқынулардың даму қаупін азайту үшін.

2. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдар алдында нені білу керек

Колдануға болмайтын жағдайлар

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдамаңыз:

- егер сіз индапамидке немесе кез келген басқа сульфонамидке, периндоприлге немесе кез келген басқа АӨФ тежегішіне немесе осы препараттың кез келген басқа компоненттеріне аллергияның болса (қосымша парактүң 6-бөлімінде көрсетілген),
- егер бұрын Сізде басқа АӨФ тежегіштерін қабылдаған кезде ыскырық дем, беттің немесе тілдің ісінуі, қарқынды қышыну немесе терінің қатты бөртпесі (анг ionevrozdyқ ісіну) сияқты симптомдар пайда болса немесе туыстарыңыздың бірінде мұндай симптомдар кез-келген жағдайда пайда болса,
- егер Сіз артериялық қысымды тәмендеттін, құрамында алискирен бар препаратты қабылдал журсеніз және Сізде қант диабеті немесе бүйрек функциясының бұзылуы орын алса,
- егер Сізде қант диабетімен байланысты бүйрек функциясының бұзылуы болса және ангиотензин II рецепторларының блокаторларын қабылдал жүрсептіз,
- егер Сізде бауырдың ауыр ауруы немесе бауыр энцефалопатиясы болса (бауыр жеткіліксіздігінің салдарынан ми функциясының ықтимал қайтымды бұзылуы),
- егер Сізде бүйрек артериясының стенозы болуы мүмкін ауыр бүйрек ауруы болса (бүйрекке қан ағымының тәмендеуі),
- егер Сізге диализ немесе қан сүзудің кез келген басқа түрі жасалса. Қолданылатын жабдыққа байланысты Нолипрел® Форте Аргинин Сізге сәйкес келмейтін препарат болып табылуы мүмкін,
- егер Сізде қандағы калий деңгейі тәмен болса,
- егер Сізде емделмеген декомпенсацияланған жүрек жеткіліксіздігіне қатысты күдік туындаста (организмдегі судың айқын іркілігі, тыныс алудың қындауы),
- егер Сіз жүрек ыргағының өзгеруіне әкелеттін препараттарды қабылдал жүрсептіз («Басқа препараттар және Нолипрел® Форте Аргинин препараты» қосалқы бөлімін қараңыз),
- егер Сіз жүкті болсаңыз немесе жүктілікті жоспарласаңыз («Жүктілік және бала емізу» бөлімін қараңыз),
- егер Сіз емізіп жүрсептіз («Жүктілік және бала емізу» бөлімін қараңыз),
- егер Сіз жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылатын препарат - валсартан + сакубитрил біріктілімін қабылдал жүрсептіз («Айрықша нұсқаулар және сақтық шаралары» және «Басқа препараттар және Нолипрел® Форте Аргинин препараты» қосалқы бөлімдерін қараңыз).

Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз:

- егер Сізде аорта стенозы болса (жүректен шыққан негізгі қантамырлардың тарылуы), гипертрофиялық кардиомиопатия (жүрек бұлышқеттің ауруы) немесе бүйрек артериясының стенозы (бүйректі қанмен қамтамасыз ететтін артерияның тарылуы),
- егер Сізде жүрек жеткіліксіздігі немесе басқа жүрек ауруы болса,
- егер Сізде бүйрек ауруы болса немесе диализ жасалса,
- егер Сізде қандағы альдостерон гормонының деңгейі өте жоғары болса (бастапқы гиперальдостеронизм),
- егер Сізде бауыр функциясының бұзылуы болса,
- егер Сізде жүйелі дәнекер тінінің ауруы болса (дәнекер тінінің зақымдалуымен сипатталатын аурулар тобы), мысалы, жүйелі қызыл жегі немесе склеродермия,

- егер Сізде атеросклероз болса (артериялардың жақтауында олардың саңылауын тарылтатын атеросклероздың түйіндақтардың пайда болуы),
- егер Сізде гиперпаратиреоз болса (қалқанша маңы бездерінің функциясының жоғарылауы),
- егер Сізде подагра болса (гиперурикемиямен ауыратын пациенттер),
- егер Сізде гиперкалиемия болса (плазмадағы калийдің мөлшері жоғары),
- егер Сізде гипонатриемия болса (плазмадағы натрийдің мөлшері төмен),
- егер Сізде қант диабеті болса,
- егер Сіз тұз мөлшері төмен диетаны ұстансаныз немесе құрамында калий бар тұз алмастырғыштарды қолдансаныз,
- егер Сіз литий немесе калий сақтайтын препараттарды (спиронолактон, триамтерен) немесе калий қоспаларын қабылдасаныз, оларды Нолипрел® Форте Аргинин препаратымен бір мезгілде қабылдауға болмайды ("Басқа препараттар және Нолипрел® Форте Аргинин препараты" қарандыз),
- егер Сіз аллопуринолды, цитостатиктерді (онкологиялық ауруларды емдеуге арналған препараттар) немесе иммунодепрессанттар қабылдасаныз немесе прокайнамидпен (жүрек ырғағының бұзылуын емдеуге арналған препарат) ем алсаныз,
- егер сіз алтын препараттарымен ем алсаныз, қабынуға қарсы стероидты емес препараттарды (КҚСП), баклофенді, кортикоидтарды, неприлизин тежегіштерін, электрокардиограммадағы (ЭКГ)QT аралығын ұзартатын препараттарды қабылдан жүрсөніз; жүрек гликозидтері; өмірге қауіпті жүрек аритмиясын туыннатуы мүмкін, препараттар («пириэт» типті полиморфты қарыншалық тахикардия),
- егер Сізге сүйек кемігі қан түзуінің тежелуі диагнозы қойылса;
- егер Сіз егде жастағы адам болсаныз,
- егер Сізде цеброваскулярлық ауру болса,
- егер Сізде реноваскулярлық гипертензия болса,
- егер Сізде артериялық қысымның цифрлары өзгермелі болса (артериялық қысымның тұрақсыз жоғарылауы),
- егер Сізде фотосезімталдық реакциялары байқалса,
- егер Сізде пенициллинге аллергиялық реакция болса,
- егер Сіз көрү қабілетінің төмендеуіне немесе көздің ауырсынуына тап болсаныз. Бұл көздің қантамыр қабатында сұйықтықтың жиналу симптомдары (хориоидальді жалқық) немесе көзге қысымның жоғарылауы болуы мүмкін, бұл Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдағаннан кейін бірнеше сағат немесе алта ішінде болуы мүмкін. Егер емделмеген болса, бұл көрү қабілетінің қалпына келмеуіне әкелуі мүмкін. Егер Сіз бұрын пенициллинге немесе сульфаниламидтерге аллергияныз болса, оның даму қаупі жоғары болуы мүмкін.
- егер Сізде бет, ерін, ауыз, тіл және тамақ ісінуімен ауыр аллергиялық реакциялар болса, олар жұтылу немесе тыныс алу қындықтарымен бірге жүруі мүмкін (ангіоневроздың ісіну). Бұл емдеу кезінде кез келген уақытта пайда болуы мүмкін. Егер Сізде осындағы симптомдар пайда болса, **емдеуді тоқтатып, дереу дәрігермен кенесу керек.**
- егер Сіз жоғары артериялық қысымды емдеу үшін қолданылатын төменде көрсетілген қандай да бір препараттарды қабылдасаныз:
 - антиотензин II рецепторларының блокаторлары (сартандар ретінде белгілі - мысалы, валсартан, ирбесартан, телмисартан), әсіресе егер Сізде қант диабетімен байланысты бүйрек кінәраттары болса,
 - алискирен.

Дәрігерінің бүйрек функциянызды, артериялық қысымынызды және қандағы электролиттердің (мысалы, калий) мөлшерін үнемі қадағалап отыруы мүмкін. Сондай-ақ, «Қолдануға болмайтын жағдайлар» бөліміндегі ақпаратты қарандыз.

- егер сіз қара нәсілге тиістілігіңіз болса, себебі Сізде ангионевроздық ісінудің даму қаупі жоғары болуы мүмкін, сондай-ақ бұл препарат басқа нәсілді пациенттермен салыстырғанда артериялық қысымды төмендетуде аз тиімді болуы мүмкін,
- егер Сізге жоғары өткізгіш жарғақшалармен диализ жүргізілетін болса,
- егер Сіз төменде көрсетілген қандай да бір препараттарды қабылдасаңыз, ангионевроздық ісінудің даму қаупі артуы мүмкін:
 - рацекадотрил (диареяны емдеу үшін қолданылады),
 - сиролимус, эверолимус, темсиrolimus және mTor тежегіштері класына жататын басқа препараттар (трансплантацияланған ағзалардың ажырамай қабылданбауын болдырмау үшін қолданылады),
 - сакубитрил (валсартанмен бекітілген біріктілімде шығарылады) созылмалы жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылады.

Ангионевроздық ісіну

АӨФ тежегіштерін, оның ішінде Нолипрел® Форте Аргинин қабылдаған пациенттерде ангионевроздық ісіну (беттің, еріннің, тілдің немесе тамақтың ісінуімен ауыр аллергиялық реакция, жұтыну немесе тыныс алудың қыындауы) жағдайлары байқалды. Бұл реакциялар ем кезінде кез келген сәтте басталуы мүмкін. Егер Сізде осы симптомдар пайда болса, Сіз Нолипрел® Форте Аргинин қабылдауды дереу тоқтатып, дәрігерге қаралу керек. 4-бөлімді де қарандыз.

Егер Сіз жүктімін ойласаңыз (немесе жүкті болуды жоспарласаңыз) дәрігерге айтуыңыз керек. Нолипрел® Форте Аргинин жүктілік кезінде қабылданбауы тиіс, себебі бұл балаға елеулі зиян келтіруі мүмкін («Жүктілік және бала емізу» қосалқы бөлімін қарандыз).

Нолипрел® Форте Аргининді қабылдаған кезде, Сіз өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге немесе медициналық персоналга келесі жағдайлар туралы хабарлауыңыз керек:

- егер Сізде анестезия және/немесе ауыр хирургиялық операция болса,
- егер Сізде жақында диарея, құсу немесе сусыздану байқалса,
- егер Сізге диализді немесе тығыздығы төмен липопротеиндердің аферезін жүргізу қажет болса (холестеринді қаннан аппараттық жолмен шығару),
- егер Сіз аралардың немесе балалардың шағуына аллергиялық реакцияларды азайтатын десенситизациядан өтсөніз,
- егер Сіз құрамында йод бар рентгендік контрасттылы зат (рентген сәулелерімен бүйрек немесе ақсазан сияқты ішкі ағзаларды тексеруге мүмкіндік беретін зат) қажет медициналық тексеруден өтсөніз,
- егер Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қолданғанда көздің біреуінде немесе екеуінде көру немесе ауыру өзгерістері байқалса. Бұл глаукоманың дамуының, көздегі қысымның жоғарылауының белгісі болуы мүмкін. Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауды тоқтатып, дәрігерге қаралу керек.

Спортшылар Нолипрел® Форте Аргинин препаратының құрамында допинг-бақылау жүргізу кезінде он реакция бере алатын әсер етуші зат (индапамид) бар екенін білуі тиіс.

Балалар мен жасөспірімдер

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер болмауына байланысты препаратты 0-ден 18 жасқа дейінгі балаларға бермеңіз.

Басқа препараттар және Нолипрел® Форте Аргинин препараты

Емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне Сіз не қабылдағаныңыз, жақында қабылдағаныңыз немесе басқа дәрілік препараттарды қабылдауды бастағаныңыз туралы хабарлаңыз.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын келесі препаратормен бір мезгілде қабылдаудан аулақ болыңыз:

- литий препараттары (мания немесе депрессияны емдеу үшін қолданылады),
- егер Сізде қант диабеті немесе бүйрек функциясының бұзылуы болмаса, алискирен (жоғары артериялық қысымды емдеуге арналған препарат),
- калий сақтайтын диуретиктер (мысалы, триамтерен, спиронолактон, амилорид), калий тұздары, сондай-ақ организмдегі калий мөлшерін арттыратын басқа препараттар (мысалы, гепарин және ко-тимоксазол, сульфаметоксазол+тиметоприм деп те аталады),
- эстромустин (онкологиялық жаңа түзілімдерді емдеу кезінде қолданылады),
- жоғары артериялық қысымды емдеуге арналған басқа препараттар: ангиотензин өзгеретін фермент тежегіштері және ангиотензин II рецепторларының блокаторлары.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратымен емдеу режиміне басқа препараттарды қабылдау әсер етуі мүмкін. Сіздің дәрігеріңіз дозаны өзгерте алады және/немесе басқа сақтық шараларын қолдана алды. Егер Сіз келесі препараттарды қабылдайтын болсаңыз, емдеуші дәрігерге хабарлауды ұмытпаңыз, өйткені оларды қабылдаған кезде ерекше сақ болу керек:

- жоғары артериялық қысымды емдеуде қолданылатын препараттар, соның ішінде ангиотензин II рецепторларының блокаторлары немесе алискирен («Қолдануға болмайтын жағдайлар» және «Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары» бөлімдеріндегі ақпаратты қараңыз) немесе диуретиктер (бүйрек шығаратын несен көлемін арттыратын препараттар),
- жүрек жеткіліксіздігін емдеу кезінде қолданылатын калий сақтайтын препараттар: эplerenон және спиронолактон күніне 12,5-тен 50 мг дозада,
- диареяны емдеу үшін (рацекадотрил) немесе трансплантацияланған ағзалардан (сиrolimus, эверолимус, темсиролимус және mTOR тежегіштері класына жататын басқа препараттар) қабылданбай ажыраудың алдын алу үшін жиі қолданылатын препараттар. «Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары» деген қосалқы бөлімді қараңыз,
- валсартан+сакубитрил біріктілімі (созылмалы жүрек жеткіліксіздігін емдеу үшін қолданылады). «Қолдануға болмайтын жағдайлар» және «Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары» қосалқы бөлімдерін қараңыз,
- пропофол, севофлуран (анестезия жүргізуге арналған препараттар),
- құрамында йод бар рентгенконтрастылы заттар,
- левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин, ципрофлоксацин, вена ішіне енгізгенде эритромицин, азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спирамицин, ко-тимоксазол (инфекцияларды емдеу үшін пайдаланылатын антибиотиктер),
- аллопуринол (подагра емдеу үшін),
- мизоластин, терфенадин немесе астемизол (пішен қызбасы немесе аллергияны емдеуге арналған антигистаминдік препараттар),
- ауыр бронх демікпесі мен ревматоидты артритті қоса, әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылатын кортикоステроидтар,
- аутоиммундық бұзылуларды емдеу үшін немесе қабылданбай ажыраудың алдын алу үшін трансплантау операцияларынан кейін пайдаланылатын иммунодепрессанттар (мысалы, циклоспорин, такролимус),
- галофантрин, лумефантрин, мефлохин, хинин, хлорофил (безгектің кейбір түрлерін емдеу үшін қолданылады),
- пентамидин (пневмонияны емдеу үшін қолданылады),
- натрий ауротиомалаты (инъекциялық алтын препараты) (ревматоидты полиартритті емдеу үшін қолданылады),

- винкамин (егде жастағы пациенттерде, оның ішінде жады жоғалуын симптоматикалық емдеу үшін қолданылады),
- бепридил, ранолазин (жұктемелік стенокардияны емдеу үшін қолданылады),
- вориконазол, итраконазол, кетоконазол, флуконазол (зенге қарсы дәрілер),
- вандетаниб, мышьяк триоксиді, оксалиплатин, такролимус, анагрелид (ісікке қарсы препараттар және иммуномодуляторлар),
- ондансетрон (құсуға қарсы дәрілер),
- алтеплаза (тромболитиктер, тромбқа әсер ету үшін қолданылатын препараттар),
- жүрек ырғағының бұзылуын емдеуге тағайындалған препараттар (мысалы, хинидин, гидрохинидин, прокайнамид, дизопирамид, флексанид, амиодарон, сotalol, дофетилид, ибутилид, бретилия тозилат, дронедарон),
- цизаприд, дифеманил, домперидон (асқазан-ішек ауруларын емдеу үшін қолданылады),
- дигоксин немесе басқа жүрек гликозидтері (жүрек ауруларын емдеу үшін),
- баклофен (көптеген склероз сияқты ауруларда пайда болатын бұлшықеттердің сіресуін емдеу үшін),
- инсулин, метформин немесе глиптиндер (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин) сияқты қант диабетін емдеуге арналған препараттар,
- кальций қоспаларын қоса алғанда, кальций,
- стимуляциялайтын іш жүргізетін дәрілер (мысалы, сенна),
- қабынуға қарсы стероидты емес препараттар (мысалы, ибупрофен) немесе салицилаттардың жоғары дозалары (мысалы, ацетилсалицил қышқылы),
- инъекциялық түрдегі амфотерицин В (ауыр зен ауруларын емдеу үшін),
- депрессия, үрей, шизофрения және т. б. сияқты психикалық бұзылуларды емдеуге арналған препараттар (мысалы, трициклді антидепрессанттар, циталопрам, эсциталопрам сияқты селективті серотонинді қармау тежегіштері; психозды емдеуге арналған нейролептиктер, мысалы, хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифлюоперазин, флуфеназин, амисульприд, сульпирид, сультоприд, тиаприд, галоперидол, дроперидол, пимозид, сертindol),
- тетракозактид (Крон ауруын емдеу үшін),
- триметоприм (инфекцияны емдеу үшін),
- тамыр кеңейтетін препараттар, нитраттарды қоса (қантамырлардың кеңеюіне әкелетін препараттар),
- вазопрессин (қант диабетін емдеуге арналған препарат),
- терлипрессин (асқазан-ішек жолдарынан, несеп шығару және жыныс мүшелерінен қан кетуді емдеуге арналған препарат),
- кетансерин, нитроглицерин (вазодилататор),
- пробукол (гиполипидемиялық дәрі),
- теродилин (спазмолитик),
- цилостазол (мезгіл-мезгіл ақсақтықты емдеуге арналған препарат),
- төмен артериялық қысым, шокты немесе демікпені емдеу үшін қолданылатын препараттар (мысалы, эфедрин, норепинефрин немесе адреналин).

Жұктілік және бала емізу

Егер Сіз жүкті болсаңыз немесе емізіп жүрсөніз, жүкті болсаңыз немесе жүктілікті жоспарласаңыз деп ойласаңыз, препаратты қолданар алдында емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз.

Жұктілік

Егер Сіз жүкті болсаңыз (немесе жүктімін деп ойласаңыз) деп ойласаңыз, емдеуші дәрігерге хабарлауыңыз керек. Әдетте, дәрігер Сізге Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауды жүктілік басталғанға дейін немесе Сіз жүкті екенінізді білген бойда бірден тоқтатуға кеңес береді. Дәрігер Сізге Нолипрел® Форте Аргинин

препаратының орнына басқа препаратты қабылдауға кеңес береді. Нолипрел® Форте Аргинин препараты жүктілік кезінде қарсы көрсетілген, өйткені оны қабылдау баланың денсаулығына елеулі зиян келтіруі мүмкін.

Бала емізу

Егер Сіз емшекпен емізетін болсаңыз, Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауға болмайды.

Емшекпен емізетін немесе емізуді жоспарлағаныңыз туралы дереу емдеуші дәрігеріңізге хабарлаңыз.

Дереу өзіңіздің емдеуші дәрігеріңізге қаралыңыз.

Көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс істеу

Нолипрел® Форте Аргинин реакция жылдамдығына әсер етпейді, бірақ кейбір пациенттерде артериялық қысымның төмендеуіне байланысты әртүрлі реакциялар, мысалы, бас айналу немесе әлсіздік байқалуы мүмкін. Нәтижесінде көліктерді немесе басқа механизмдерді басқару қабілеті бұзылуы мүмкін.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының құрамында лактоза моногидраты бар

Егер Сізде қанттың кейбір түрлеріне жақпаушылық болса, осы препаратты қолданар алдында емдеуші дәрігеріңізben кеңесініз.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының құрамында натрий бар

Бұл препараттың құрамында бір таблеткаға 1 ммольден az (23 мг) натрий бар, яғни мәні бойынша құрамында натрий жоқ.

3. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдау.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын емдеуші дәрігердің немесе дәріхана қызметкерінің ұсынымдарына толық сәйкес қабылдаңыз. Күмән болған жағдайда емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз.

Ұсынылатын доза

Ұсынылатын доза: тәулігіне бір таблетка. Сіздің емдеуші дәрігеріңіз препаратты қабылдау режимін өзгертуі мүмкін (мысалы, егер Сізде бүйрек функциясының бұзылуы анықталса).

Қолдану тәсілі

Ішке, дұрысы таңертең, тамақ ішер алдында. Таблетканы су іше отырып, тұстастай жүту керек.

Қолдану ұзақтығы

Артериялық гипертензияны емдеуге арналған препараттарды үнемі қабылдау керек.

Егер Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қажет болғаннан артық қабылдаған болсаңыз

Егер Сіз тым көп таблетка қабылдаған болсаңыз, дереу дәрігерге хабарлаңыз немесе жақын мандағы жедел жәрдем бөліміне хабарласыңыз. Артық дозаланған жағдайда анағұрлым ықтимал симптом - бұл артериялық қысымның төмендеуі болып табылады. Егер Сіздің артериялық қысымыңыз күрт төмендесе (жүрек айнуы, құсу, құрысуулар, бас айналуы, үйқышылдық, сананың шатасуы, бүйрек шыгаратын несеп көлемінің өзгеруімен қатар жүретін жағдай) жатып, аяғынызды көтеріңіз. Бұл Сіздің жағдайыңызды жақсарта алады.

Егер Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауды ұмытып қалсаныз
Препаратты күн сайын қабылдау өте маңызды, өйткені қабылдаудың жүйелілігі емдеуді тиімдірек етеді. Дегенмен, егер Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратының кезекті дозасын қабылдауды ұмытып кетсеңіз, әдеттегі уақытта келесі дозаны қабылданыз. Өткізіп алған дозаны өтеу үшін Нолипрел® Форте Аргинин дәрілік препаратының қосарлы дозасын қабылдамаңыз.

Егер Сіз Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауды тоқтатқан болсаңыз
Жоғары артериялық қысымды емдеу әдетте үнемі жүргізілетіндіктен, емдеуші дәрігеріңізben алдын ала талқылаусыз Нолипрел® Форте Аргинин дәрілік препаратын қабылдауды тоқтатпаңыз.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қолдану бойынша сұрақтар болған жағдайда емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне қаралыңыз.

4. Іктинал жағымсыз реакциялар

Барлық дәрілік препараттар сияқты Нолипрел® Форте Аргинин препараты жағымсыз реакциялар туындауы мүмкін, алайда, олар барлығында байқала бермейді.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдауды тоқтатыңыз және мынадай күрделі жағымсыз реакциялардың бірі туындаған жағдайда деру медициналық көмекке жүгініңіз:

- төмен артериялық қысымнан туындаған қатты бас айналу немесе естен айрылу (жі 10 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- бронх түйілуі (кеудедегі қысылу сезімі, ысқырық дем және ентігу) (жі емес – 100-адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- беттің, еріннің, ауыздың, тілдің немесе тамақтың ісінуі, тыныс алушының қындауы (ангионевроздық ісіну) («Айрықша нұсқаулар мен сақтық шаралары» 2-бөлімін қараңыз) (жі емес – 100 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- көп формалы эритеманы қамтитын терінің ауыр реакциялары (бет, қол немесе аяқтағы қызыл қышитын жерлердің пайда болуынан басталатын тері бөртпесі) немесе қарқынды тері бөртпелері, есекжем, дененің бүкіл беткейіндегі терінің қызаруы, қатты қышыну, күлдіреуіктің пайда болуы, терінің қабыршануы және ісінуі, шырышты қабықтың қабынуы (Стивенс — Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз) немесе басқа аллергиялық реакциялар (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- жүрек тарарапынан бұзылулар (жүрек ырғағының бұзылуы (соның ішінде брадикардия, қарыншалық тахикардия, жүрекше фибрилляциясы), жүктемелік стенокардия (дене жүктемесінен туындаған кеуденің, жақтың және арқаның ауыруы), миокард инфарктісі (жүрек ұстамасы) (өте сирек-10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- қолдағы немесе аяқтағы әлсіздік, инсульттің белгісі болуы мүмкін сөйлеу кінәраттары (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- үйқы безінің қабынуы (панкреатит), ол іштің және арқаның ауыр ауырсынуын тудыруы мүмкін, хал-жағдайдың нашарлауымен қатар жүреді (өте сирек – 10000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- терінің немесе көз акуыздарының сарғаюы (сарғаю), бұл гепатиттің белгісі болуы мүмкін (өте сирек – 10 000 адамның ең көп дегендеге 1-үндеге туындауы мүмкін),
- өмірге қауіп тәндіретін аритмия («пируэт» типті полиморфты қарыншалық тахикардия) (белгісіз – қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес),

- бауыр функциясының бұзылуынан туындаған мидың ауруы (бауыр энцефалопатиясы) (белгісіз – қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес),
- жоғары қысымға байланысты көру қабілетінің төмендеуі немесе көздің ауыруы (көздің тамырлы қабығында сұйықтықтың жиналудының ықтимал белгілері (хориоидальді жалқық)) (белгісіз-қолда бар мәліметтерге сүйене отырып, пайда болу жиілігін анықтау мүмкін емес).

Пайда болу жиілігі бойынша кему тәртібімен жағымсыз реакциялар мынадай болуы мүмкін:

- жиі-10 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:

аллергиялық және демікпелік реакцияларға бейімділігі бар пациенттердегі тері реакциялары, бас ауыруы, бас айналуы, вертиго, парестезия (аяқ-қолдағы шаншуды сезіну), көрудің бұзылуы, құлақтың зыңылдауы (құлақта шуыл), жөтел, ентігу, ас қорыту жүйесі тарарапынан бұзылыс (жүрек айну, құсу, іштің ауыруы, дисгевзия (дәм сезудің бұрмалануы), диспепсия немесе ас қорытудың қындауы, диарея, іш қату), аллергиялық реакциялар (тері бөртпесі, терінің қышынуы), бұлшықеттің түйілуі, астения (шаршауды сезіну);

- сирек - 1 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:

көңіл-күйдің өзгеруі (көңіл-күйдің күбылуы), ұйқының бұзылуы, есекжем, пурпуралар (терідегі қызыл дақтар), пемфигоид (терідегі ошакталған күлдіреуіктің қалыптасуы), бүйрек жеткіліксіздігі (бүйрек функциясының бұзылуы), эректильді дисфункция (импотенция), қатты терлеу (терлеу), эозинофилдер мөлшерінің жоғарылауы (лейкоциттердің түрі), зертханалық параметрлердің өзгеруі: гиперкалиемия (қандағы калийдің жоғары деңгейі), емді тоқтатқаннан кейін төмендейді), гипонатриемия (натрийдің төмен деңгейі); ұйқышылдық, естен тану (естен айырылу), жүрек қағысын сезіну (өз жүргіннің қағысын сезіну), тахикардия (жүректің жиі соғуы), диабетпен ауыратын пациенттердегі гипогликемия (қандағы қант деңгейі өте төмен), васкулит (қантамырлардың қабынуы), ауыз қуысының шырышты қабығының құрғауы, фотосезімталдық реакциялары (терінің күнге сезімталдығының жоғарылауы), артralгия (буындардың ауыруы), миалгия (бұлшықет ауыруы), кеуде қуысының ауыруы, дімкәстану, шеткері ісіну, қызба, қандағы мочевина мен креатинин концентрациясының жоғарылауы, құлау;

- сирек - 1000 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:

псориаздың асқынуы (ағымының нашарлауы), зертханалық параметрлердің өзгеруі: «бауыр» ферменттерінің белсенделілігінің артуы, гипербилирубинемия (қандағы билирубин концентрациясының жоғарылауы); қатты қажу;

- өте сирек - 10 000 адамның ең көп дегенде 1-үндеге туындауы мүмкін:

сананың шатасуы, эозинофильді пневмония (пневмонияның сирек кездесетін түрі), ринит (мұрынның бітелуі немесе тұмаурату), жедел бүйрек жеткіліксіздігі (бүйрек тарарапынан ауыр бұзылулар); қан тарарапынан лейкоциттер мен эритроциттер санының азаюы сияқты бұзылулар: агранулоцитоз, аплазиялық анемия, панцитопения, лейкопения, нейтропения, гемолиздік анемия, гемоглобин мен эритроциттердің төмендеуі гематокрит, тромбоцитопения (тромбоциттер санының азаюы), гиперкальциемия (қандағы кальцийдің жоғары деңгейі), бауыр функциясының бұзылуы;

- белгісіз (қолда бар деректерге сүйене отырып, туындау жиілігін анықтау мүмкін емес):
электрокардиограммадағы (ЭКГ) ауыткулар (QT аралығының ұзаруы), зертханалық параметрлердің өзгеруі: гипокалиемиямен калий концентрациясының төмендеуі (қандағы төмен калий), несеп қышқылы мен қандағы глюкоза концентрациясының жоғарылауы; миопия (алыстан нашар көру), көрудің бұлдыңғырануы, көру қабілетінің бұзылуы, Рейно синдромы (саусақтар мен саусақтардың ауыруы және ауыруы). Егер Сізде жүйелі қызыл жегі болса (дәнекер тінінің ауруы), жағдайыңыз нашарлауды мүмкін.

Қан, бүйрек, бауыр немесе үйқы безі тараапынан бұзылуы және зертханалық параметрлердің өзгеруі мүмкін (қан талдауында). Сіздің дәрігеріңіз жағдайыңызды бақылау үшін қан талдауын тағайындаі алады.

Несеп концентрациясының жоғарылауы (бұл жағдайда оның күнгірттенуі байқалады), жүрек айну немесе құсу, бұлшықеттің түйілуі, сананың шатасуы және құрысулар АДГ (антидиурездік гормон) жеткіліксіз секрециясынан туындауды мүмкін. Егер Сізде осындағы симптомдар болса, мүмкіндігінше төзірек емдеуші дәрігермен байланысыңыз.

Жағымсыз реакциялар туралы хабарлама

Егер Сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар болса, емдеуші дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесініз. Оларға қосымша парапта көрсетілмеген кез келген жағымсыз реакциялар да жатады. Сіз сондай-ақ дәрілік препараттың жағымсыз реакциялары туралы тікелей хабарлай аласыз (төменде қараңыз). Жағымсыз реакциялар туралы хабарлай отырып, Сіз препараттың қауіпсіздігі туралы көбірек ақпарат алуға көмектесесіз.

Ресей Федерациясы

Денсаулық сақтау саласындағы қадағалау жөніндегі федералдық қызметі (Росздравнадзор)

109012, Мәскеу қ., Славян алаңы, 4 үй, құр. 1.

Тел: +7 (800) 550 99 03

Эл. пошта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

<http://roszdravnadzor.gov.ru>

Армения Республикасы

«Академик Э. Габриелян атындағы дәрілер мен медициналық технологияларды сараптау ғылыми орталығы» ЖТАҚ

0051, Ереван қаласы, Комитас даңғылы, 49/5

Тел.: +374 (60) 83 00 73, +374 (10) 23 08 96, +374 (10) 23 16 82

Дәрілер қауіпсіздігін мониторинглеу бөлімінің жедел желі телефоны: +374 (10) 20 05 05, +374 (96) 22 05 05

Эл. пошта: admin@pharm.am, vigilance@pharm.am

<http://pharm.am>

Беларусь Республикасы

«Денсаулық сақтаудағы сараптама және сынақ орталығы» УК

220037, Минск қ., Товарищеский түйік көшесі, 2а үй.

Тел.: +375 (17) 231 85 14

Факс.: +375 (17) 252 53 58

Фармакологиялық қадағалау бөлімінің телефоны: + 375 (17) 242 00 29

Эл. пошта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

<http://www.rceth.by>

Қазақстан Республикасы

Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау үлгітік орталығы" ШЖҚ РМК

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

010000, Астана қ., Байқоңыр ауданы, А.Иманов көшесі, 13 (БО «Нұрсаулет 2»)

Тел.: +7 (717) 278 99 11

Эл. пошта: farm@dari.kz

<http://www.ndda.kz>

Қыргыз Республикасы

Қыргыз Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі жаңындағы Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және медициналық техника департаменті

720044, Бішкек қаласы, 3-я Линия көшесі, 25

Тел.: +996 (312) 21 92 78

Эл. пошта: dlsmi@pharm.kg

<http://pharm.kg>

5. Нолипрел® Форте Аргинин препаратын қабылдау

Препаратты баланың қолы жетпейтін жерде, бала көре алмайтын жерде сактаңыз.

Құтыда және картон қорапшасында көрсетілген жарамдылық мерзімі (сақтау мерзімі) өткеннен кейін "дейін жарамды" деген сөздерден кейін препаратты қолданбаңыз. Жарамдылық мерзімі аталған айдың соңғы күні болып табылады.

30°C-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Препаратты кәрізге немесе тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Дәріхана қызыметкерінен енді қажет емес препаратты қалай утилизациялау (жою) керектігін тексеріңіз. Бұл шаралар қоршаған ортаны қорғауға мүмкіндік береді.

6. Қаптаманың ішіндегісі және өзге де мәліметтер

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының құрамында натрий бар

- Индапамид және периндоприл аргинині эсер етуші заттар болып табылады.
Улбірлі қабықпен қапталған әрбір таблетканың құрамында 1,25 мг индапамид және 5 мг периндоприл аргинин бар (периндоприл негізінің 3,395 мг сай келеді).
- Басқа ингредиенттер (қосымша заттар) лактоза моногидраты, магний стеараты, мальтодекстрин, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы, натрий карбоксиметилкрахмалы (А типі), глицерол, гипромеллоза, макрогол 6000, магний стеараты, титаның қостотығы (E171) болып табылады.

Нолипрел® Форте Аргинин препаратының сыртқы түрі және қаптамасының ішіндегісі

Улбірлі қабықпен қапталған таблеткалар.

Препарат ақ түсті үлбірлі қабықпен қапталған ұзынша таблеткалар болып табылады.

"Лаборатории Сервье Индустри" өндіріс жасында, Франция

14 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (14 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-паракпен

картон қорапшада.

Стационарларға арналған қаптама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парақпен тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

"Лаборатории Сервье Индастри", Франция өндіріс және "СЕРВЬЕ РУС" ЖШК, Ресей буын-тую / қаптау кезінде :

14 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (14 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парақпен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қаптама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда. 3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парақпен алғашқы ашылуы бақыланатын тең санымен картон қорапшада.

"СЕРВЬЕ РУС" ЖШК, Ресей өндіріс кезінде:

14, 29 немесе 30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (14, 29 немесе 30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парақпен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қаптама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда. 3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парақпен тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

"Лаборатории Сервье Индастри", Франция және өндіру және өлишеп-оралу (буын-тую)

«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд», Ирландия кезінде:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

1 құтыдан (30 таблеткадан) алғашқы ашылуы бақыланатын қосымша-парақпен картон қорапшада.

Стационарларға арналған қаптама:

30 таблеткадан дозатормен және ылғал сініретін гелі бар тығынмен жабдықталған полипропиленнен жасалған құтыда.

3 құтыдан (30 таблеткадан) қосымша-парақпен тең санымен алғашқы ашылуы бақыланатын картон қорапшада.

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

«Лаборатории Сервье»/Les Laboratoires Servier

92284 Франция, Сюрен Седекс, Карно к-си 50/
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France,

Өндіруші

"СЕРВЬЕ РУС" ЖШК

108828 Ресей, Мәскеу қ., Краснопахорское кенті, 158 квартал, 2 иелік, 1 күр.
немесе

"Лаборатории Сервье Индастри" / Les Laboratoires Servier Industrie
шоссе Саран, 45520 Жиди, Франция/905, route de Saran, 45520 Gidy, France

немесе

«Сервье (Ирландия) Индастриз Лтд»/Servier (Ireland) Industries Ltd
Графство Уиклоу, Арклоу, Гори роуд, Манилендс, Y14 E284, Ирландия/
Co. Wicklow, Arklow, Gorey Road, Moneylands, Y14 E284, Ireland

Препарат туралы кез келген ақпарат алу үшін тіркеу күәлігін ұстаушысының жергілікті өкіліне жүгіну қажет:

Ресей Федерациясы

"Сервье" АҚ

Мекенжайы: 125196, Мәскеу қ., Лесная к-сі, 7 үй, 7/8/9 қабат

Тел.: +7 (495) 937 07 00

Факс: +7 (495) 937 07 01

Эл. пошта: servier.russia@servier.com

Беларусь Республикасы

Беларусь Республикасындағы "Les Laboratoires Servier" АҚ өкілдігі (Франция Республикасы)

Мекенжайы: 220030, Минск қ-сы, Мясников көшесі, 70, кенсе, 303

Тел.: +375 (17) 306 54 55/56

Эл. пошта: officeBY@servier.com

Армения Республикасы

"Лаборатории Сервье" өкілдігі

Мекенжай: 0002, Ереван қаласы, Амирян көшесі, 15, магазин 100, Кентрон

Тел.: +374 (10) 50 50 74

Эл. пошта: mariam.antonyan@servier.com

Қазақстан Республикасы және Қыргыз Республикасы

"Сервье Қазақстан" ЖШС

Мекенжайы: 050020, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 310Г

Тел.: +7 (727) 386 76 62

Эл. пошта: kazadinfo@servier.com

Қосымша парақ қайта қаралды

Басқа ақпарат көздері

Препарат туралы толық мәліметтер Одақтың веб-сайтында

<http://eec.eaeunion.org>.

Қосымша парақ Одақтың веб-сайтында Одақтың барлық тілдерінде қолжетімді.